



JOANNIS
BROWNE


regis Chirurgi ordinarius

MYOGRAPHIA

edidit alter

multis in locis

Apud JACOBUM MOUKEUM
Bibliopolam Leydenfem



MYOGRAPHIA
NOVA
SIVE
MUSCULORUM
OMNIUM

(In Corpore Humano hætenùs reperorum)

Accuratissima Descriptio, in

Sex PRÆLECTIONES Distributa.

Nomina Singulorum

In suo quæque Loco, situque Naturali, in Æneis MUSCULORUM
Iconibus exarantur: Eorum item Origines, Insertiones,
& Usus, Graphice Describuntur, Additis insuper
ipsius *AUTHORIS*, & aliorum
Nuperrimis Observationibus
& Inventis.

OPERA & STUDIO

JOANNIS BROWNE, *Serenissimi CAROLI Secundi, Britanniarum
Regis, Nec-non Nosocomii Regalis, quod est ad D. THOMÆ,
Chirurgi Ordinarii.*



LUGDUNI BATAVORUM,

Apud JACOBUM MOUCKEE.

M. D. C. LXXXVII.

А И Ц А Р Я О Г Р А П И А
А В О И

4512

MUSCULORUM

M U I N M O

(In 6 more minutes repetition)

Account Number: 0000000000

29 PRÆLECTIONES Disputatae.

Neonix sinuatum

[illegible]

02 FEB 2 1972

JOHANNIS BROWN, Sheriff of the County of Carroll, Kentucky.
To the Honorable the Senate of the State of Kentucky.



NOTES

APR 14 1961

DEPARTMENT OF THE ARMY



CELSISSIMO PRINCIPI

JACOBO,

Eboraci & Albaniae Duci, Ultoniae
Comiti, &c.

Et quod omnes Titulos
Omne Decus Nomenque sua uigius claritudine perstringit,

CAROLI SECUNDI

Serenissimi Sapiientissimique Britanniarum REGIS, uno
Providentiae Miraculo restituti, perpetuo servati,
Amico certissimo, ac Germano FRATRI.

Celsissime PRINCEPS,



UM Musculi sint Virium
Humanarum Fundamenta,
cui potiori jure consecratur
ea, quæ de his a nobis insti-
tuitur Tractatio, quam tibi
fulcro ac Tibicini rerum
Britannicarum, cujus Corporis Heroici
Divinum robur, animique in Dubiis aut
afflictis rebus inconcussa firmitudo terrâ
marique tam insignia extiterunt, ut nulla
gens tam barbarâ, tam dissita reperiat,ur,
tamque a famæ tuæ celebritate aliena, quo
tui nominis ingens admiratio, cum metu
quodam & formidine conjuncta non pervas-

lit. Fortitudinem Prudentiamque tuam, sicut, debent agnoscunt Hispani, sensere Galli, & ad earum vel levissimam mentionem ac memoriam totis artibus contremiscunt Belgæ, adeo ut Sanguine Regno conjunctissimus, virtutibus tamen Regiis, conjunctior videaris.

Tibi itaque (Celsissime Princeps) hasce
Museulorum omnium Iconas nova Methodo
delineatas & expressas, (quasi tot votivas Ta-
bulas pro vitâ exoptatissimâ tuâ primum à
fluctuum deinde à tetriori Schismaticorum
rabie Supremi Numinis auspicio liberatâ)
Humillimè dicat consecratque

Celfitudinis tuæ.

Clips devin&issimus

Ac Servus Humillimus.

I. BROWNE.

S Y N O P S I S,

S E U

Brevis Enumeratio

Omniū Musculorū Humani Corporis,

C U M

Suis Propriis Nominibus, in situ naturali,
uti in Dissectione exhibentur.

O Bliquus Descendens.
Obliquus Ascendens.
Rectus.

Pyramidalis.

Transversalis Abdominis.

Frontalis.

Corrugator.

Aperiens Palpebram rectus.

Claudens oculum superior.

Claudens oculum inferior.

Recti quatuor Musculi Oculi.

Obliquus primus Oculi.

Obliquus secundus Oculi.

Attollens Aurem.

Detrahens Aurem.

Adducens Aurem.

Abducens Aurem.

Externus Tympani auris.

Internus Tympani auris.

Abducens Nasi alas.

Attollens Nasi alas.

Claudens Nasum externus.

Communis claudens Alas.

Zygomaticus Riolani.

Abducens Labia.

Deprimeñs Labii inferius.

Constringens Labia.

Platysma Myodes seu Quadratus.

Buccinator.

Masseter seu Mansorius.

Temporalis sive Crotaphites.

Mastoides.

Biventer sive Digastricus.

Coracohyoides.

Sternohyoides.

Sternothyreoides.

Hyothyreoides.

Styloceratothyroideus.

* *

Ptery*

Pterygopalatinus.
 Spheno-palatinus.
 Mylohyoides Riolani.
 Geniohyoides.
 Myloglossus.
 Ceratoglossus.
 Genioglossus.
 Hypoglossus.
 Styloglossus.
 Lingualis.
 Cricothyroides anticus.
 Oesophagus seu Sphincter gulæ.
 Stylopharyngæus.
 Cephalopharyngæus.
 Cricoarytænoides Posticus.
 Cricoarytænoides lateralis.
 Arytænoides.
 Thyroarytænoides.
 Sphenopharyngæus primus.
 Sphenopharyngæus secundus.
 Pterygoides externus.
 Pterygoides internus.
 Longus.
 Scalenus.
 Pectoralis.
 Subclavius.
 Serratus major Anticus.
 Serratus minor Anticus.
 Intercoştales externi.
 Intercoştales interni.
 Cremasteres.
 Director Penis.
 Accelerator penis.
 Musculi Clitoridis.
 Levatores Ani.

Sphincter Ani.
 Sphincter Vesicæ.
 Detrusor Urinæ.
 Diaphragma.

Hic Corpus primum Jaceat.

Trapezius seu Cucullaris.
 Latissimus Dorsi.
 Rhomboides.
 Levator Patientiæ.
 Rotundus major.
 Suprascapularis superior.
 Suprascapularis inferior.
 Nonus Humeri Placentini
 five Rotundus minor.
 Subscapularis.

*Si totum Brachium à corpore cum
 Scapula discindas, horum Mu-
 sculorum sequentium dissectio
 est facilius perficie-
 tur.*

Deltoides.
 Biceps.
 Octavus Humeri Placentini
 five Coracobrachialis
 Brachii internus.
 Gemellus major.
 Gemellus minor.
 Anconæus.
 Palmaris.
 Caro musculosa Quadrata.

Flexor Carpi interior seu Ulnaris.

Flexor Carpi exterior seu Radialis.

Flexor secundi Internodii Perforatus.

Flexor tertii Internodii Perforans.

Flexor tertii Internodii pollicis.

Pronator Radii Teres.

Pronator Quadratus.

Flexores primi Internodii digitorum.

Flexor primus, primi Internodii pollicis.

Flexor ejusdem secundus.

Flexor secundi Internodii Pollicis.

Primas
Secundus
Tercius
Quartus.

Minimi Digiti Abductor.

Pollicis Abductor.

Pollicis Adductor.

Interossei.

Extensor Carpi exterior.

Extensor secundi & tertii Internodii digitorum.

Supinator Radii Longus.

Extensor pollicis ossis tertii.

Extensor secundi & tertii pollicis.

Abducens Indicem.

Supinator Radii brevis.

Primi Internodii extensores.

Hic ad Corpus ipsum revertas ut in situ priori dispositum fuit.

Serratus Posticus superior.

Serratus Posticus inferior.

Splenius.

Trigeminus.

Transversalis.

Spinatus.

Recti majores.

Recti minores.

Obliqui superiores.

Obliqui inferiores.

Longissimus Dorsi.

Sacrolumbus.

Cervicalis descendens.

Sacer.

Semispinatus.

Quadratus.

Psoas parvus.

Si Femur à Corporis Trunco sejungas, dividendo os Ileon ab osse sacro subsequentiū musculorum dissectio melius peragetur.

Iliacus internus.

Glutæus major.


Glutæus medius.


Glutæus minor.


Pyriformis seu Iliacus externus.


Obturator internus.

Quadrigeminus.	Gasterocnemius internus.
Obturator externus.	Subpopliteus.
Membranosus.	Flexor tertii Internodii perforatus.
Sartorius.	Adducens Pollicem.
Gracilis.	Abducens minimum digitorum.
Rectus.	Transversalis Placentini.
Vastus externus.	Tibialis anticus.
Vastus internus.	Peroneus primus.
Biceps.	Peroneus secundus.
Semimembranosus.	Extensor tertii Internodii digitorum.
Seminervosus.	Extensor secundii Internodii digitorum.
Triceps.	Interossei.
Lividus.	
Gasterocnemius externus.	
Plantaris.	









SYLLABUS Clarissimi Domini Doctoris CAROLI SCARBURGII

Equit. Aurat. & Medici Regis Primarii, de Universis Corporis Humani Musculis in usum Theatri nostri
Anatomici olim adornatus. Et à Clarissimo Domino Doctore GULIELMO CROUNE
nunc Prælectore Doctissimo usurpatus & denuò expolitus.

Musculi in supino Corpore.

PRÆLECTIO PRIMA.

Abdominis Compresores } Obliquus } Descendens } Ascendens
Compressor } Rectus, } Pyramidalis, } Transversalis

Musculi } Testium } Cremasteres.
Scroti } Dartos } Directores
Penis } Acceleratores } urinae.

PRÆLECTIO SECUNDA.

Musculi Faciei.

Musculi } Frontalis
Superiorum } Corrugator
Oris } Orbicularis Clausi
Palpebrarum } Elevator Palpebræ
Nasi } Elevator
Nasi } Dilator } Alæ Nasi.
Constrictor } Zygomaticus seu Diffor-
tor Oris.

Musculi } Elevator } Labii superioris.
Labiorum } Depressor } Labii inferioris
Depressor } Spinifer Labiorum.

Musculi } Buccinator seu Constrictor
Genarum } cum Ductu Salivæ.
Quadratus } Elevator

Musculi } Depressor } Auriculæ
Auriculæ } Abductor

Musculi } Coracopharynx Elevator
Maxillæ } Digastricus Depressor
inferioris } Malleolæ ad lacerā movens
Pterygoideus } extern. abductor
intern. abductor

Motores Introsusum.

Sarissium } Dorsum
Rerissimæ } Rerissimæ
Sylacentoxyloides, } Coracohyoides.
Musculi } Anteriorum Sarissimæ
offic Hy- } Mylohyoides.
oidis } Geniohyoides
Anteriorum Dorsimæ
Sternohyoides.

Musculi } Sarissium } Dorsum
Linguae } Styloglossus } Ceratoglossus
Anteriorum } Retrostomus
Sarissimæ } Genioglossus } Myloglossus,
Ipsam Linguae Musculi:

Capitis Flexores } Masticoides.

PRÆLECTIO TERTIA.

Musculi } Elevator
Laryngis } Hyothyroideus
Depressor
Sternohyroides.
Constrictor.

Thyroideus } Cricothyroideus.

Arytenoidis } Classares.
Cricothyroideus } Iner-
nalis.

Thyroarytenoides.
Aperientes.
Cricothyroideus posticus.
Arytenoides.
Dilatantes.

Musculi } Stylopharyngeus
Pharyngis } Sphenopharyngeus
Cephalopharyngeus
Constrictor.
Orophageus
Vagina Gulae

Pterygoidei supra nomeni iam sunt me-
xianæ conjuncti.

Musculi } Supralesores.
Pterygoidei } Pterygoidei
Extensorum Elevator
reotis. Internus Depressor.

Musculi } Obliquus major cum Troch-
leis & masticulo Trochleari
Obliquum } Obliquus minor.

Recti } Elevator } Oculi.
Depressor } Abductor
Abductor

Musculi } Fibrae Ciliales
Tympani } Læxator externus.

Musculi } Tensor internus.
Auris } Longus
Colli } Scalenus.

Musculi Anteriorum Supralesorum Truncus
Alligati.

Deltoideus
Pectoralis
Serratus } major } axillæ.
minor }

Musculi in Thorace anteriori conjuncti.
Subclavius
Intercostales } Interni
Triangularis
Diaphragma.

Musculi Anteriorum Inferiorum Truncus
alligati.
Psoas } magnus
parvus.

Lumborum Flexor Quadratus.
Musculi } Spinae
Vellæ } Dorsalis
Hæsterni Musculi capitis Trunci & Artuum
in Corpore supin.

PRÆLECTIO QUARTA.

Musculi in prono Corpore.

Sarissium } Supralesorum
Trapezi pars superior.

Elevator
Rerissimæ
Trapezi pars media
Rhomboideus

Musculi Anteriorum Superiorum Truncus ali-
gati.
Costarum } Ducti Latissimus
Elevatorum } Serratus } superior } Pollicis
inferior } Splenius,
Complexus

Capitis } Recti } majores
Extensorum } Recti } minores
Capitis } Obliqui } superiores
Rotatores } inferiores

Colli } Transversalis
Extensorum } Spinalis Colli.
Dorsalis } Sacrolumbalis
Extensorum } Spinalis Dorsi
Lumborum } Serratus
Extensorum } Gluteus } medius
} obliquus
} externus

Musculi Anteriorum Inferiorum in flexu con-
juncti.

Pyroformis
Meripialis
Quadratus

Musculi } Sphincter } cutaneus
Ani } vaginalis
interni
Levatores } externi
superiores
inferiores.

Intercostales hic iterum in parte postica
ad Originem eorum investigandas ostendi
possunt.

Corde Musculi.
Hæsterni Musculi Trunci & Artuum in prono
Corpore.

PRÆLECTIO QUINTA.

Musculi } Elevatores
Deltoideus
Supraspinalis
Infraspinalis
Obliquus Capitis

Musculi } Depressores
Teres minor
Subscapularis

Musculi } Adductores
Pectoralis
Coracobrachialis
Biceps
Brachialis
Internus

Musculi } Abductores
Teres major
Latissimus dorsi
Biceps
Brachialis
Externus
Anconaeus

Musculi vo- } Constrictor
le minores } Palmaris
Musculi } Flexores
Carpi } Radialis
Ulnaris
Ulnaris

Musculi ad } Flexores
et in } Flexor perforatus
venendi } Perforans
dissecant

Musculi } Extensor
Comminutus
Indicis
Anconaeus

Primi Lumbales Intercostales.
Musculi } Flexores
Pollicis } Flexor tertii Internodii
Primi geminus
Secundi Trigemini

Musculi } Extensor
Tertii Internodii
Primi & secundi Internodii

Musculi } Adductor } Abductor
Indicis } Adductor } Abductor
Anconaeus } Adductor } Abductor

Musculi } Pronatores
Radii } Quadratus } Longus
Teres } Brevis

PRÆLECTIO SEXTA.

Musculi totius Pedis.

Musculi } Flexores.
Psoas } Magnus
Parvus
Iliacus

Extensorum
maximus
medius
minimus

Glutei } Abductores
Sartorius } Membranosus.
Triceps } Adductores

Intersusum } Pectinalis
Extensorum
Teres major
Latissimus dorsi
Biceps
Brachialis
Externus
Anconaeus

Musculi } Extensorum
Tibiarum } Rectus
Vastus } externus
internus
Cruralis
Flexores

Musculi } Biceps
Seminembranosus
Seminervosus
Gracilis
Subpopliteus

Musculi } Flexor
Tarsi } Tibialis anticus
Extensorum
Recti } Gastrocnemius externus
Plantaris
Gastrocnemius internus
Obliqui } Tibialis posticus
Peroneus } primus
secundus

Musculi } Extensor
Digitorum } Extensor tertii Internodii.
Pedis } Primi Internodii.
Flexores
Perforans
Perforatus
Primi Lumbales

Musculi } Extensor
Pollicis } Flexor
Pedis } Flexor 1^{us} & 2^{us} Internodii pol-
Abductor
Adductor

Musculi minimi } Adductor
Digiti Pedis } Transversalis.

FINIS.

Prælectio prima

PRÆLECTIO PRIMA.

Obliquus Descendens.

HOC primum par Musculorum, quo natura, tanquam Velo, cooperuit Abdomen, induitur fibris in obliquum actis, & à descensu *descendens par* vocatur. Hic Musculus à latere accipitur ablatum. Oritur autem ab inferiori parte sextæ, septimæ, octavæ, nonæque costarum, serratâ quâdam specie accommodatûm, applicatumque *Serrato Majori Antico*, membranolum fit in Transversis processibus coxendicalium vertebrarum, & in parte Ossis Ilei deinde pertransiens *lineam albam* in *Os Pubis*, lato Nervosoque tendine in medium fertur abdomen. Hic Musculus tam arctè tendini subjecto adhæret, ut sine laceratione vix ac nè vix quidem possit divelli. Qui quidem tendo unâ cum socio suo Tendine, sive lacer sive supra modum in latitudinem auctus, facit ut aut Omentum aut certè intestina in Inguen sive Scrotum prolabantur, unde oritur Hernia quam ab Omento aut intestinis in inguen sive Scrotum decidentibus, Chirurghi Medicique Omentalem, intestinalemque dixerunt. Si vis hunc Musculum scitè disseccare, separabis ab eo *latissimum* dorsi, ubi primum inseritur, jungiturque descendenti, sic enim fiet, ut originem *descendentis*, quæ in lumbis requirenda est, facilius clariusque disseccando assequaris.

Usus hujus Musculi præcipuus, uti *Columbus Laurentiusque*, Idonei testes, affirmant, in contractione Thoracis collocandus est, quem sæpenumerò sursum cogit, & incredibile quantum inservit Respirationi. Omnino memoratu in hoc loco dignum est, quod de hoc Musculo scriptum reliquit *Laurentius*, eum nempe, contrâ quàm fieri solet in cæteris Corporis humani Musculis, perpetuò incurvari, & in sese introrsum reverti priusquam operetur, quo fit ut facilius comprimens & coarctans internas ventriculi & abdominis cavitates, laxitudinem inferioris ventris cohibeat interno nisu, qui sursum tendit, & saburram viscerum eadem operâ extrudit & elidit foras. Quinetiam & illud observari velim, quod hi Musculi constringunt Intestina, in Angulis oblique descendentibus.

Obliquus Ascendens.

*Superius for-
tus aduscat
priori in con-
tractu actione
compressioni.*

Proximè substernitur obliquo descendentis & præditus Fi-
bris ascendentibus oritur carnosâ facie ab Ossis Ilei ap-
pendice, à processibus autem earundem vertebrarum,
ut prius, Membranosus; inde ascendens in costas undecimam,
duodecimamque margine carnosâ, porrigitur in tendinem
laxum, duplicemque, cui alligatur Musculus Rectus; pergit au-
tem inde ad *lineam albam femuraremque*, & inseritur in costas
nonam, decimam, undecimam, duodecimam. Musculus hic
certissimè facillimèque inter disseccandum ostenditur, si prius
Nervum, qui inter hunc Musculum transversumque Medius
reperitur, juxta Os Ileon, unde nascitur, quæras.

Ufus.

Ufus & Actio principalis hujus Paris, si *Columbo* credimus
hic est, ut deorsum trahat Musculos Thoracis naturâ in hoc
constituente seriem Fibrarum, prioribus in obliquo descenden-
te oppositam & contrariam, ut eo arctior compressio fiat.

obj.

Quibus addi potest, nisi me animus fallit, quod cum hic
Musculus obliquè ascendens juxta Os Pubis obliquè perfore-
tur à Musculis Cremasteribus, Spermaticisque Venis & Arte-
riis, paulo suprà foramen Musculorum obliquè descendentium
hoc ideo fieri, ut obliquè ascendentes Musculi obliquè descen-
dentibus proximè substrati, contrario Fibrarum motu, cogant
eos in angulos obliquè ascendentes.

Porrò cum diversi Musculi Abdominis diversimodè seipso
introrsum contrahentes, detrudant eadè operâ Viscerum
excrementa, & contrario Fibrarum in sese redeuntium motu
reducant ventriculum & intestina, in suum quæque locum si-
tumque naturalem, observandum tamen est, motum muscu-
lorum abdominalium motui diaphragmatis oppositum & ini-
micum esse, & vice versâ motum Diaphragmatis motui mus-
culorum Abdominalium, nam cum Diaphragma suo motu
dilatat Thoracem ut eo commodius recipiat pulmonem ab
aëris ingressu tumentem ac distentum, ejus superficies ad pla-
ni & Horizontalis formam proximè accedens ita deprimit sto-
machum & intestina, ut chylus in *Ductum Chyliferum* motu
lenissimo sensim insinuetur. E contra verò cessante ipsius dia-
phragmatis pressurâ, pulmonibus, extrulo aëre, in suum habi-
tumque priorem redeuntibus, tunc Musculi Abdominales partes
suas agunt & de diaphragmate, dum idem in arcum trudent, quasi
vindictam sumunt, sursum premendo & coarctando Thoracem,
unde ventriculo statim flaccescente, Intestina & Stomachum tra-
hunt introrsum & sursum, per contractionem Musculorum ab-
dominalium.

Rectus.





Rectus.

HOC tertium par Musculorum Fibras habet rectas, & fortes, & carne benè multâ obvolutas: oriuntur ab Osse Pubis, & procedentes inde per longitudinem Corporis inferuntur in latera sterni, ubi costarum ultimæ, quæ quidem propriè costæ dicuntur, suas cartilagineas habent. Insertiones horum Musculorum variæ & multimodæ in variis corporibus reperiuntur; interdum tres videntur, interdum quatuor, interdum tres cum dimidiâ, interdum à superiore sterni parte, interdum ab inferiore. Sicut etiam Anastomoses valorum mammillarium externorum, & Epigastricorum internorum, quas sceminae constanter habent, masculi rarer, neque minus admirabilis est varietas ista quæ oritur ex multitudine Nervorum ad perigrapha recti paris pertinentium, nam ubicumque vides quatuor Perigrapha, ibi nulli sunt Musculi Pyramidales.

Inter omnes constat hos Musculos, qui recti dicuntur, singulares animalium corporibus fructus utilitatesque præstare, sed qui tandem usus aut solus aut præcipuus haberi debeat, non perinde convenit inter omnes. Aliis assignantibus abductionem penis à costis deorsum versus, quod pertinet, quod cum surgimus de lecto, hi musculi videntur tumescere & extrinsecus impleri. Alii verò statuunt eorum utilitatem in inflexione Thoracis esse constitutam, utpote qui deducunt pectora versus Os Pubis, & retrahunt eodem tempore Os Pubis versus Thoracem, ita ut ex horum Musculorum ancipiti contractione duo simul, iique planè diversi & oppositi motus oriuntur.

Ego autem, si conjecturam meam fas est interponere, Mallem ut hi Musculi originem ducentes ab Osse Pubis & sterno, & inferentes se in lineam albam, & decurrentes in longitudinem per Medium abdomen, hunc potius usum corporibus animalium præstare judicentur, ut insertiones premant introrsum, & opitulentur motui, qui Peristalticus dicitur, in exclusione grandioris Excrementi.

Pyramidalis five Succenturiatus.

*Hic addendum
describitur pri-
mus.*

NOmen Sortitur à Pyramidis formâ, quam probè imita-
tur; oritur latus & carnosus ab externâ parte ossis Pu-
bis, & transiens nonnihil infrâ rectum, inseritur ten-
dine longo & rotundo in lineam albam; hi Musculi nonnun-
quam abesse deprehenduntur in iis, quibus obigit origo mus-
culi ascendens non ab Osse Ileo, sed à forti ligamento intemè
transienti à spinâ usque ad Os Pubis, quique præditi sunt qua-
tuor Perigraphis in recto.

Vesalius, *Adernius* & *Columbus* in eo omnes conveniunt, Py-
ramidales & rectos eandem utrosque originem habere, sed per-
peram; nam pro comperto affirmare possumus hos Musculos
ab invicem evidentissimè distingui.

Fallopia eorum primus indagator, actionem eorum collo-
cat in compressione, & affirmat eos promovere urinæ excre-
tionem. *Laurentius* ait; si hujus paris unus à socio suo seor-
sim operetur, lineam albam trahi deorsum, obliquè; si simul
ambo concurrant in agendo, directè & ad perpendiculum
eandem cogi, & simul comprimi inguinis & vesicæ partem
quando mittitur ad libitum urina. *Columbo* placet, erectionem
Penis ab his Musculis plurimum juvari, verum ejus sententia
Lloydio non probatur, situ repugnante, & præterquam quod
non pertingunt uspiam ad penem, etiam in feminis manife-
stè deprehenduntur.

Transver-

TAB. IV.



TAB. V.



Transversalis.

O Ritur à lumborum processibus transversis, ab osse ileo, Promis abdomi-
na inter-
sum. & à Cartilagineâ parte internâ inferiorum costarum, inclusus Membranz Nervosæ, & ab eodem ligamento procedens quo Pyramidalis; habet etiam carneam originationem ab internâ parte costarum, quæ nothæ sive spurix dicuntur, & desinit in latum tendinem ad semilunares Membranas, & lineam albam, & sic deorsum usque ad Os Pubis; adhæret firmiter adjacenti peritonæo per totam longitudinem ad Pubem usque, sed in pube separatur. Bartholinus ait, præcipuum ejus usum in Coli compressione versari. Sed inter omnes Anatomicos constat, hos Musculos tractioni abdominis introrsum inservire, actioni utique omnino necessariæ ad contractionem ventriculi inferioris; Spigelius ei aliam actionem assignat, nempe quod Thoracem versus latera in gyrum agit, eâ ratione Fovens & excitans calidum naturale; accedit quod hi muscoli solito crassiores, tutelam quandam præstant partibus subjectis.

Musculus Transversalis obliquè perforatur, à cremasteribus Musculis, & à Spermaticis Venis & Arteriis, paulò suprâ Musculum obliquè ascendentem; ità ut Foramina obliquè descendens ascendensque Musculorum abdominalium sibi invicem affabrè accommodata, in lineis non ad perpendicularum sive nadir sed ad Horizontem rectis, intercipient & obstruant intestinorum transitum, nè decendant in scrotum. Transversales Musculi latitudinem abdominis transversim transeunt occurrunt Fibris Rectis, quæ cohibent intestina per longitudinem abdominis descendentiâ, sicut Fibræ transversæ transversim transeunt, Fibras recti secant ad Angulos rectos, & ità muniunt intestina transversim, sive in abdominis latitudinem.

Cremaſteres, five Sufpenſorii.

Testiculi tribus tunicis perpetuò veſtiuntur. viz. 1. Erythroide five rubrà. 2. Elythroide five vaginali. 3. Albugineà five nerveà. Extimæ Membranæ primæ tunicæ adnascuntur Musculi Cremaſteres, alius atque alius ab alterutrâ parte, qui quidem Musculi in Maribus originem fortiuntur à ligamento Offis Pubis.

Dartos.

Nihil aliud eſt quam cutis ipſa in quâ teſticuli ſuſpenſi, ceu in bursâ continentur, Fibris carnoſis inſtructa, quarum beneficio, pars hæc variè contrahitur corrugaturque.

Director Penis.

Oritur ab appendice coxendicis, infrâ originationem corporum Nervoſorum, in cujus interiori parte, etiam craſſiſſimæ Fibrarum exitum fortiuntur & evaneſcunt præ tenuitate.

Accelerator Urinæ.

Oritur carnoſus à Sphinctere Ani & cum ſocio ſuo internè & à latere conjunctus, progreditur in anteriora penis inferiturque urethris, & vulgò creditur urethris dilatandis à naturâ factus.

Femur pellicanis
primo




Fig. 6.



Fig. 5.





Fig. 4.



Fig. 8.



Fig. 7.




Fig. 3.



Fig. 2.

PRÆLECTIO SECUNDA.

*Frontalis.**Frontem at-
tendens.*

HIC Musculus oritur à parte Frontis elatissimâ, ubi desinit capillitium, quâque Membrana carnosâ cranio firmissimè adhæret, haud ità longè à Musculo temporali, deinde rectâ decurrens in cutem oculos tegentem, inque supercilia inferitur. Hunc Musculum à cranio separans inter dissecandum, inveniēs nervos in eum, ab eodem utique cranio Immissos.

*Obj.**Ufus.**Corrugator.*

A summo Naso vel Majori oculi Cantho exortus, obliquè versus tempora incedit, ibique sensim inter Fibras Musculi Frontalis attenuatur & desinit.

Occipitalis.

In paucis reperitur, originem à futurâ Lambdoide educit, inque carnosam membranam, quæ & Frontis Musculos excipit, inseritur.

*Orbicularis Clausor.**Oculum de-
fractus.*

Oritur ab initio acuto ex interiore oculi cantho & parte Supercilii Naso proximâ, unde transit obliquo & propè transverso ductu & carneus latiusque transeundo factus inseritur in canthum exteriorem.

*Elevator Palpebræ.**Oculi Ele-
vator.*

Oritur à summo Naso propè angulum Palpebræ inferioris tenuis, membranofus & acuminatus, unde transverso tramite in mediam ferè palpebram delatus carneus fit. & inseritur tandem, progrediendo transversim, in eundem angulum cum orbiculari.

*Elevator alarum Nasi.**Elevator
Nasi.*

Oritur à summo Nasi ossè juxta foramen Lacrymale, initio acuto simul & carneò; unde à latere descendens itinere triangulari & per torum illud os transcurrens, latus carneusque inferitur in alas Nasi, quas sursum trahit & nares unâ aperit ac dilatat.

Ufus.

*Nasi alarum
Dilatator.*

Dilatator alarum Nasi.

Oritur ab initio tenui & carneo, ex osse Maxillæ superioris, propè primum par Musculorum labialium, & in inferiorem superioremque alarum partem insertus; eas sursum trahit & Nares unâ dilatat.

*Constrictor
alarum Nasi.*

Constrictor alarum Nasi.

Hic à quibusdam Orbicularis dicitur in superiori labro deprehensus, quod deorsum cogendo, eadem operâ coarctat nares. Scripsit Bartholinus observâsse se appendicem quandam hujus Musculi in labrum superius descendere, idque in iis hominibus qui Nasos suos attollere nequibant, nisi simul attollerent etiam superius labrum. Hic autem adeò suprà modum gracilis est, ut visum penè fugiat, neque possit commodè celo representari.

*Labium supe-
rius atollens.*

Zygomaticus seu Distortor Oris.

Oritur ex osse Zygomate, ab initio carneo & lato; unde obliquè deorsum & prorsum decurrens inseritur in latius labii superioris propè Nasi primum, qui illum sursum cogens, utrinque à lateribus adjungit sibi.

*Elevator La-
bii.*

Elevator Labii superioris.

Oritur, ut prior, ex osse Zygomate, carneus, rotundus, & obesus, & labiis insertus, illic ubi labia desinunt & committuntur, ducit ea sursum & extrorsum.

*Depressor La-
bii inferioris.*

Depressor Labii inferioris.

Oritur carneus ab infimâ & extimâ parte inferioris Maxillæ, unde obliquè decurrens crassiusculus inseritur mediullio labii inferioris, cogens illud deorsum & extrorsum. Hic in aliquâ sui parte creditur à plerisque Quadrato detrahenti tam arctâ necessitudine conjunctus, ut uterque Musculus in unum coalescat.

*Labii Or-
bicularis.*

Orbicularis sive Sphincter Labiorum.

Hic utrique labio communis & è materiâ Fungosâ vel spongiosâ factus, oritur cum fibris in orbem redeuntibus à mediis ossibus utriusque Maxillæ, & labiis eam, quam præ se ferunt, formam attribuit. Os nempe circuit sphincteris instar, labia

labia ad se mutuò velut in osculum trahens, quæ cuti rubræ firmiter adhærent colorem suum rubrum & coccineas Veneres vicissim labiis impertienti.

Buccinator seu Constrictor cum Ductu salivari.

*Constrictor
Labii &
genarum.*

Oritur perinde à Maxillâ utràque à superiore nempe parte superioris, & ab inferioris inferiore, ubi incipit gingiva & genas complectitur flexu circulari. Tunica oris propria adedò firmiter ei intus adhæret, ut ab eo non nisi ægrè admodum separari ac divelli queat: à parte suâ exteriori tendinem habet magnum rotundumque in medium ejus insertum, qui quidem tendo ortum ducit à materiâ quâdam glandulosâ, ossi Zygomatico, juxta initium ipsius adnascente, hic autem Musculus dentibus hunc usum præstat, ut cibum versus illas agat expellatque si qui fortè in intervallo genarum & gingivæ nondum satis comminutus & præmansus, gulæ & stomacho rectè committi non possit.

Quadratus, seu Platysma Myodes.

*Genarum
Depressor.*

Hic Musculus sub colli cute situs, gracilis ibidem visitur & Membranofus, eidemque cuti firmiter adhærens. Oritur autem à vertebra colli, scapulâ, claviculâ & sterni, tenuis & latus, cum fibris Membranosis benè mixtus, unde sursum pergens cum fibris obliquantibus inseritur mento, quâ labia conjunguntur, & oris aperturæ sive hiatui promovendo inservit. Sequitur à convulso spasmus Cynicus. Ad scilicet ejus indagationem ostensionemque in celebrandâ dissectione, relinquantur, oportet, elongationem ejus, quæ facit *adductorem auris* ad interiora, quem quidem adductorem rarò desiderabis. Cura etiam quàm maxima adhibenda est, in eo à cute, cui ut suprâ dictum est, arctissimè adhæret, peritè separando.

Crotaphites seu temporalis.

*Elevator
mandibule
superioris.*

Oritur ab osse Frontis, Sincipitis, & Sphenocide, carneus & semicircularis; unde, angustior factus, Os jugale subit, cum brevi, sed firmissimo & carneo tendine, juxta processum inferioris Maxillæ, cui nomen est Corone. Huic assignantur tres Nervi ab alterutro latere, primus à tertio, secundus à quarto, & tertius à quinto pari, quo factum est, ut vulnera hac in parte accepta, periculosa certè semper, nonnunquam verò, etiam mortifera reperiantur. Hunc Musculum si scitè elevas, sub eo periostrium invenies, etsi contrarium multi asse-

ratio. Maxillam inferiorem sursum trahit, os unà claudens dentesque constringens.

Digastricus sive Biventer.

*Maxilla
inferioris
digressor.*

Oritur à processu styloide latus & nervosus, unde rotundus, carneus, gracilisque factus, ubi primum sub styloide recurvatur, Tendo fit nervosus & rotundus. Dein autem carneus iterum apparet, & in mediam interioremque partem inferioris Maxillæ inferiur, quam deorsum trahendo os aperit.




Masseter.

*Maxilla
inferioris
diversifor-
mā mover.*

Oritur à duplici initio, firmus, amplus & Nervosus, primò à suturâ, quâ quartum & primum superioris Maxillæ ossa committuntur, deinde carneus ab ossè jugali, in Maxillæ inferioris partem exteriorem firmiter largiterque insertus, maxillam inferiorem fibris suis variè intertextis prorsum, retrorsum & à latere movet.

Ele-





*Elevator Auris.**Aurem ad
solam.*

Oritur à termino exteriore musculi frontalis unde; tenuis & membranofus transit in temporalem, & inferitur, angustior factus, in superiorem auris partem, eam sursum & antrorsum ciens.

*DetraCTOR Auris.**Deorsum
movens.*

Oritur carneus latusque & quandoque fibrosus à sincipitio, propè processum mamillarem, unde tenuior in progressu factus in totam cartilaginem, quæ aurem ambit inferitur. Cave sis in cute elevandâ, nè hunc musculum elevés, & elevando perdas. Aurem ciens deorsum antrorsumque.

os.

*Adductor Auris.**Antrorsum
movens &
navisibil
sursum.*

Musculus hic participat cum duobus aliis, utpote qui partim pertineat ad eum quem *Spigelius* vocat *quadratum buccæ detrahentem*, & partim in eo reperiatur quem Anatomici appellant *Platysma Myodes*. A cujus insertione invenies carneam & fibrosam Elongationem in auris radices inditam. Aurem ducit sursum & antrorsum.

*Abductor Auris.**Retrorsum
movens.*

Oritur suprà processus mamillares à Musculorum congerie; qui in occipitio reperiuntur, initio tenui & angusto, unde deorsum transverso ducto delatus, & cum duplici, interdum etiam triplici tendine insertus in partem auris posticam, retrorsum eam ducere perhibetur.

*Laxator Internus.**Extror
Tympani.*

Oritur à superiore & inferiore parte meatûs auditorii initio satis amplo, deinde carneus evadens inseritur extrinsecus cum tendine breviusculo in Tympanum, membranam ejus unâ cum malleo extendens sursum & extrorsum. Curabis diligenter in osse petroso aperiendo, nè ossiculorum Frustula incautiùs comminuta, officiat huic musculo, iâ ut ostendi commodè non possit.

*Tensor Internus.**Tensor in
internus.*

Hic musculus intrâ os petrosûm situs, oritur à basi ossis Cuneiformis, unde carneus, & simul tenuis angustusque factus, postquam dimidium itineris sui emensus sit, dividit se

in duos tendines tenuissimos: quorum alter in superiorem processum malleoli inseritur, alter in collum ejus, movens cum obliquè antrorsum & introrsum.

Obliquus major cùm Trochleâ.

*Obliquus
movens in-
trorsum.*

Oritur à parte eâdem quâ abducens, progrediturque lineâ rectâ ad externam partem Canthi interioris, ubi non-nihil crassescit; deinde tenuior & rotundior factus trochleam pervadit ipsi destinata; quam ubi pertransierit, sic se recurvat, ut secet oculum ad angulos rectos. Tum sursum evehctus repentè obliquatur, & *Levatores* præteriens inseritur inter Musculos abducentes & obliquos. Volvit oculum introrsum motu circulari.

Ufus.

Obliquus Inferior.

*Extor-
sionem.*

Oritur à rimâ quâdam in orbitæ ocularis inferiore segmento, ab initio suo carneus, gracilis & ad rotundum accedens, & obliquo cursu per totum itineris sui spatium delatus, ascendit paulatim in partem oculi superiorem, & tendine brevi, nervo-foque inseritur juxtâ tendinem abducentis. Movet oculum extorsum.

Ufus.

Elevator Oculi.

*Elevator
Oculi.*

Oritur ab orbitâ oculi superius, illic ubi Nervus Opticus ex orbitâ procedit, & in corneam oculi tunicam inseritur, tendine tenui & membranoso. Ufus ejus, ut nomen satis indicat, in attollendo oculo versatur.

Ufus.

Depressor Oculi.

*Humilis
sive depri-
menda.*

Oritur ab ejusdem cavitationis, quâ prior, parte inferiore, & inseritur eodem modo; oculum deducit versus mentum, minor quidem prior, qui ei in actione velut Antagonista est, nec ab inæquali horum musculorum magnitudine redduntur eorundem vires inæquales, quia minor vis requiritur in motu deorsum, quam in eo qui sursum tendit.

Adductor Oculi.

*Introrsum
adducens.*



Oritur ab oculi orbitâ juxtâ originem *Elevatoris*, ducens oculum introrsum versus Nasum, à nonnullis Bibitorius ab usu appellatur, quem præstat Combibonibus, in calice inspiciendo, nè sit Festucis vel alio quovis recrementi genere Fadatus.

Abductor Oculi.

*Extorsum
abducens.*

Oritur ab exteriori oculi Cantho, & inseritur ut prior, & oculus ab his quatuor postremis musculis cooperantibus ducitur introrsum.





Styloceratohyoides.

O Ritur à radice processus Styloidis, & gracilis rotundusque inferitur in cornu Ossis Hyoidis. Index ejus certissimus est Digastricus, vel per eum transiens oblique, vel sub eo, & movens Os Hyoides oblique sursum. Inferitur ab inferiori parte cornu Ossis Hyoidis, vel potius versus basin ejusdem, trahens illud oblique sursum. Retrosu-
m movens Os
Hyoides.

Coracohyoides.

Oritur carneus ab initio colli Ossis Scapulæ, ab ejus processu Coracoide, & subter levatorem patientiæ per Scapulam oblique transiens fertur in Mastoiden, ubi tendo fit gracilis rotundusque, & mox iterum carneus inferitur cornibus Ossis Hyoidis, quod oblique deorsum trahit. Retrosu-
m movens Os.

Mylohyoides.

Oritur carneus à latere interno inferioris Maxillæ sub dentibus molaribus, & inferitur extrinsecus in basin Ossis Hyoidis. Antro-
sum fer-
vensque
movens.

Geniohyoides.

Oritur intrinsecus à mediâ parte inferioris Maxillæ, quæ Mentum vulgò dicitur, unde deorsum fertur brevi, lato & carneo Itinere, & inferitur in cavitatem sibi à Naturâ factam ad basin Ossis Hyoidis, quod rectè sursum trahit, & nonnihil antrosum. Antro-
sum fer-
vensque
movens.

Sternohyoides.

Oritur carneus & latus ab interiore parte Sterni, sub cute cervicis, & transiens super asperam arteriam & Thyreoidalem Cartilaginem (ejusdem ubique consistentiæ & latitudinis) inferitur in basin Ossis Hyoidis, quod rectè deorsum trahit, & nonnihil retrorsum. Retrosu-
m deorsu-
mque mo-
vens.

*Styloglossus.**Motus
lingue sur-
sum.*

Oritur carneus & tenuis & initio acuto, à Styloidalī processu, unde latior factus carnosiorque inseritur in latus linguæ, quam sursum cogit & introrsum. Ostenditur optimè hic Musculus, si digito Styloiden aperias ac denudes, ac oculum deinde dirigas versus marginem linguæ: in hominibus tenuis est & simplex, in bestiis duplex, carnosus, & crassus.

*Ceratoglossus.**Motus
lingue de-
orsum.*

Inditur obliquè in latera linguæ juxtà radicem ejus: hoc par si simul operetur, trahunt linguam deorsum & introrsum: si unus tantum ab altero seorsim agat, sequitur linguæ motus in dextram & sinistram.

*Genioglossus.**Motus lin-
gue sur-
sum.*

Oritur ab initio angusto circa medium Maxillæ inferioris sive Menti, dein latior factus inseritur in radicem linguæ. *veslingius* hunc imputat Musculis Ossis Hyoidis, eumque ait inferi ad basin ejusdem Ossis, quod rectà sursum trahit, quo lingua faciliùs ex ore protrudatur.

*Myloglossus.**Motus lin-
gue sur-
sum.*

Oritur latus ab internâ & laterali parte inferioris Maxillæ, insertus ligamento quod basin linguæ faucibus adnectit. In dissectione reperies hunc Musculum circa originem Mylohyoidis, & ostendes optimè divulsis Maxillis. Quando hujus paris unus seorsim movetur, tota lingua sursum flecti sentitur. Quando ambo simul in agendo conspirant, extremitas ejus rectà versus palatum fertur.

*Hypoglossus seu Basiglossus.**Motus lin-
gue retror-
sum.*

Oritur carnosus à basi Ossis Hyoidis, & in medium linguæ secundum longitudinem ejus insertus, eam introrsum & retrorsum cogit.

Mastoides.

Oritur ab initio duplici, cavitate quâdam initia dirimen- ^{Capitis}
 te, & alter quidem hujus partis, à sterno, nanciscitur ori- ^{fictor.}
 ginem nervosam, alter verò, ab elatiori parte claviculæ,
 carnosam: obliquè autem inseritur uterque in Mamillarem
 processum, rotundo & carneo tendine. Hic si Musculi simul
 ambo operentur, caput inclinant prorsum; si singulatim
 unus & ab altero seorsim agat, sequitur motus capitis à la-
 tere nutantis, & velut in humerum reclinaturi.

PRÆLECTIO TERTIA.

Hyothyreoides.

Laryngis

Oritur ab integro latere Ossis Hyoidis juxta basin, unde latus fibris rectis decurrit, & inseritur in partem inferiorem lateralemque Cartilaginis scutiformis, quam attollendo, rimam ejus dilatat. Hunc Musculum si ab origine & insertione suâ penitus sejungas, eò facilius invenies musculos Laryngis, quem hic musculus motu suo naturali sursum trahit.

*Sternothyreoides.*Laryngis
Depressor.

Oritur carnosus & latus à superiore & inferiore parte Sterni, & eandem ubique magnitudinem servans, serpit porro per longitudinem Asperæ Arteriæ cum Fibris rectilineis, & insertus in latus inferius Cartilaginis scutiformis, rimam ejus angustiolem facit.





*Cricothyreoides.*Constrictor
Laryngis.

Oritur ab Anteriore parte Cartilaginis Annularis, & definit in latera scutiformis, trahens Annularem, ut Anatomici vulgò statuunt, obliquè deorsum, & sic extendens eandem, aperiendo rimam ejus, ut sic vox grandior & clarior fiat.

*Cricothyreoides lateralis.*Arytænoidis
Clavicularis.

Oritur ab inferiore parte Cartilaginis Annularis, & exinde sursum vergendo inseritur in latus externum Arytænoidis, aperiens Laryngem, obliquè diducendo ejus Cartilaginem, & creditur vulgò extendere Laryngem expansione laterali.

Thyre-





Thyreoarctenoides.

Oritur carneus, latus & transversim inditus in cavitatem Laryngis, ab inferiore parte medii Thyreoidis, & sursum secundum ejus longitudinem vectus, inseritur in latus Arytænoidis, glottida constituens, à cujus constrictione clauditur Larynx. Musculus hic facillimè planissimèque ostenditur dividendo Cartilaginem Thyreoidem à Cricoide, Arytænoide, Musculisque subjectis: quarum si tunicis, ne quid à cultro anatomico detrimenti capiant, ritè prospiciatur. Thyreoarctenoides manifestò se ostendet. Hoc par in Anginâ vehementius inflammatum, obturans rimam intercludit spiritum, & affectis hoc malo mortem affert certam & inevitabilem.

Cricoarctenoides Posterior.

Oritur carnosus ab inferiore & posteriore parte Cricoidis, unde sursum fibris rectis progrediens, & cavitatem Cricoidis adimplens, inseritur nervosè in Arytænoidis interiora, & divisione Cartilaginum Arytænoidalium aperit Laryngem.

Arytænoides.

Oritur cum fibris obliquis ab Arytænoide, ubi jungitur Cricoidi, & in eum jam denuo insertus, adnectitur pari suo. Movet Arytenoida obliquè in alterutrum latus, & constringendo basin ejus, glottida claudit.

Stylopharyngeus.

Oritur initio tenui ab interiore parte processûs Styloidalis, unde exili specie descendens inseritur, tendine membranoso, in Thyreoida, in latera Ossis Hyoidis & in radices Linguae. Promove contractionem Oesophagzi, sive Sphincteris gulæ, de quo mox agemus.

Sphenopharyngeus.

Oritur tenuis & Nervosus propè cuspidem appendicis Ossis cuneiformis, & descendens inde per internam cavitatem Pterygoidis, inseritur exili tendine in membranosam Palati partem, unde proficisci Gargateon videtur, cujus partes alimento recipiendo dilatat. Neque hunc neque focium ejus inter dissecandum sine summâ molestiâ ac difficultate ostendes.

*Cephalopharyngæus.**Pharyngis
Constrictor.*

Oritur à Cranio & primâ vertebrâ colli, & inde descendens inseritur in latera Ossis Hyoidis, in Cartilaginem scutiformem & initia OEsophagi, cui tunicam fecisse videtur, quam ubi attollit, constringit una fauces in actione deglutiendi.

*Pharyngis
Constrictor.*

Oritur carnosus & est ubique latus, procedit à latere Cartilaginis scutiformis secundum longitudinem ejus, & OEsophago, circumcundo eum, pro Sphinctere est. Hunc Musculum, si ritè elèves, eo facilius invenies Scylopharyngæum & Cephalopharyngæum.

Ptery-

Alfred, Lord Tennyson
 Poems, 1830-1850
 1. The Charge of the Light Brigade



Pterygopatinus.

Inter Musculos Fancium locum sibi suo jure vendicant duo ^{Depressor Palati.} paria ab eruditissimo Viro D. Doctore *Crounio* nuper adinventata. Situs est autem hic Musculus in interiore parte cavitatis Ossis Pterygoidis, & terminatur cum tendinibus suis (qui super partem aliquam Ossis suprâ dicti, ut super trochleam quandam, glomerantur) circa glandulam Palati, quam unâ cum uvulâ deprimere reperitur.

Sphenopalatinus.

Oritur ab Ossè Sphenoide, & lato tendine inseritur in latera ^{Elevator Uvula.} glandulæ palati, quam, sicut & uvulam, attollit. A situ & actione horum Musculorum nonnulli existimant rationem reddi posse quare uvula relaxata reduci possit in situm naturalem, applicando extrinsecus articulum flexi pollicis ad eosdem Musculos vel ad Palatum.

Pterygoides Externus.

Oritur, ex aliquâ sui parte, ab externâ parte processûs aliformis, ut & etiam ab asperâ & acuminatâ lineâ Ossis Sphenoidis, firmus, nervosus, & carnosus; unde decurrens latus, inseritur valido latoque tendine in interiorem partem inferioris Maxillæ, proximè subjectus tendini Musculi temporalis; & Maxillam cogens antrorsum, veluti abducit eam à Capite. ^{Abductor Maxille inferioris.}

Pterygoides Internus.

Oritur latus & brevis ab interiore cavitate processûs aliformis, primò quidem nervosus, deinde carnosus, & inseritur ^{Abductor Maxille inferioris.} lato, longo, nervosoque tendine internè & à latere in inferiorem Maxillam, quam sursum trahendo promovet actionem Musculi temporalis, & eodem tempore Maxillam cogit introrsum & retrorsum. Hi duo Musculi nunquam comparent, donec integra dissectio Lingux, Laryngis & Gulæ peragatur.

*Longus.*Culi Fl-
deter.

Oritur acuminatus & carnosus à parte corporis posticâ, a quintâ & sextâ vertebrâ Thoracis, illic ubi costæ Spinam attingunt, inde sursum sub Æsophago transiens jungitur lateribus omnium vertebrarum; ascendens eo usque donec ad primam vertebram perveniat, ubi *scaleno* junctus, uterque se inserit acuto nervolôque tendine in transversum processum primæ vertebræ colli. Collum ab hoc pari flectitur antrorsum; sin unus tantum seorsim operetur, motus fit à latere.

*Scalenus.*Culi Fl-
xer.

Oritur à primâ & supremâ costâ Thoracis, latus & carnosus, deinde angustior in ascensu factus, Fibras transversas transversis colli processibus impertit, & inseritur ut longus, quem in motu juvat. Habet hic Musculus peculiarem cavitatem sibi à Naturæ providentiâ attributam, eam nempe per quam Arterix in brachium descendentes, & Venæ ex eodem ascendentes transeunt. Hoc par si simul uterque operetur, collum & caput sic contrahunt, ut cogant rectâ antrorsum; sin unus ab altero seorsim agat, fit motus quidam medius ex laterali motu, & eo qui antrorsum peragitur, constitutus.





Deltoides.

O Ritur, ut plurimum, nervosus, primò quidem antro-
sum à medio claviculæ, juxta *Os humeri*, ubi clavicu-
la maximè in latitudinem extenditur, deinde à summâ
scapulâ, ubi jungitur claviculæ, postremò à spinâ scapulæ uni-
versâ: quæ omnes hujus Musculi originationes, carnosæ, &
angusto Tramite pergunt in tendinem validum ubique externè
carneum, internè nervosum, & inferitur transversim sub cervi-
ce *Os humeri*. Attollit, porrigit, vel retrahit Brachium, pro
diversâ serie usuque Fibrarum, quarum Adminiculo nititur in
operando.

Pectoralis.

Oritur à media claviculâ, ubi maximè rotundus est, & jux-
ta Pectus carnosus; deinde à sterno secundum longitudinem
ejus, & Cartilaginibus ejusdem implicatur; postremò à Carti-
laginibus, sextâ, septimâ & octavâ costarum, ubi nervosus in
originatione repertus, procedit inde carneus & latus, donec
perveniat ad latera Thoracis, ubi tendo fit brevis, validus, &
latus, & inferitur in *Os humeri* secundum longitudinem ejus,
inter Musculos *Deltoidem* & *Bicipitem*. Movet Brachium versus
Pectus antrosum, idque vel directè & horizontaliter, vel non-
nihil desuper, vel sursum versus; pro variâ contractione supe-
riorum vel mediarum vel inferiorum Fibrarum.

Serratus majus Anticus.


Oritur à tertiâ, quartâ, quintâ, sextâ, septimâ, octavâ, nonâ,
decimâque costis, initio *serrato*, nervoso & acuto, deinde super
costas ad carnis naturam accedens, inferit se carneum in in-
tegram basin scapulæ Intrinsecus. Motus hujus Musculi juva-
tur à Musculo abdominis *obliquè descendente*, & hic quando se
retrahit versus originationem suam, trahit unâ scapulam in an-
teriora, (id quod etiam facit *serratus minor*) motu lenitèr de-
clivi.

Serratus minor Anticus.

Subjicitur totus *MusculoPectorali*, in Anticâ parte Thoracis, & dicitur *ferratus* à similitudine ferræ; carneis fibrarum dentibus affatim acuminatæ; minor verò, ut à *ferrato majori* distinguatur, oritur cùm totidem ferratis originationibus, à quatuor costis, exceptâ duntaxat unicâ, supremis, & inde angustior factus in descensu versus scapulam, inseritur latus, carneus, & nervosus in ejusdem scapulæ processum rostriformem, quem cõgit prorsum, & Thoracem versus. Hoc par Musculorum si uterque simul agat, trahunt scapulam versus Pectus: Si is, qui ex duobus superior est, seorsim operetur, tunc scapula sursum moveretur; quod si inferior in motu solitarius existat, deorsum.

Diaphragma.

Hic Musculus, omnium, qui in humano Corpore reperiuntur, si unum Cor excipias, facîle Princeps, oritur à primâ vertebrâ lumborum; figurâ circularis est, & multum discrepans, quoad situm, à cæteris Musculis, superficies ejus basi Thoracis transversæ est æqualis, inseritur in sterno anteriore, & illic ubi terminantur costæ germanæ, ut & in costâ duodecimâ, & à lateribus in ipsâ extremitate earum costarum, quæ quia non nisi improprie & æquivocè id nominis adeptæ sunt, *Costæ sive Spuriæ* ab *Anatomicis* dicuntur. In mediotallo ejus, ut eò valentior, habiliorque sit ad obeundas partes sibi à naturâ formatrice destinatas, membranosus nervosusque est, & illic carnea fibrarum turba, velut in centrum, coit: Lethale est ibi, quicquid vulneris infligitur, sed in cæteris Diaphragmatis partibus, etiam si faucibus fuerint, non est temerè salus desperanda.





Subclavius.

Oritur ab inferiore parte claviculæ, & in progressu dilatatur. Obliquistransversisque fibris inseritur in primam costam juxta sternum, quod sursum trahendo, & extrorsum; eâdem operâ dilatat Thoracem. Dilatatio-
nem Thoracis
deur-
sum.

Intercostales externi.

Originem sortiuntur à transversis processibus spinæ, illic ubi costis junguntur, & inde procedentes inserunt se extrinsecus continuâ insertione ab inferiore parte supremæ ad superiorem infimæ costarum, exinde pergentes ad Cartilaginem sterni. Externi hi Musculi inter respirandum contracti, trahunt costas sursum & extrorsum versus origines suas; unde Thoracis cavitas dilatatur. Dilatatio-
nem Thoracis
deur-
sum.

Intercostales Interni.

Initia sumunt à costis, hic ubi incipiunt introrsum flecti, & transeunt ab earum imâ ad supremam partem, non modo usque ad Cartilaginem sterni, sed & subter Cartilaginem ad sternum ipsum. Hi Musculi prioribus in actione sunt contrarii, deducetes & introrsum trahentes Thoracem in respiratione, unde Thorax constringitur & cavitas ejus unâ coarctatur. Constric-
tionem Thoracis
deur-
sum.

Triangularis.

Oritur exilis gracilisque à sterno inferiore, & adhæret Cartilagini superiorum costarum; ab utroque ejus latere quasi Ramulos mittens ad extremitates osteales dictas, per quas germanarum tertia, quarta, quinta, sextaque costæ junguntur Cartilaginibus suis, quarum attractione constringunt & non nihil deprimunt Thoracem.


*Sphincter Vesicæ.**Constrictor
Vesicæ.*

Ambit instar annuli fundibulum five Collum vesicæ, cui tam arctè semper adhærescit, ut credas ejusdem esse cùm vesicâ substantiæ: indicat seipsum rotundo quodam, ex quo constat, collo: usus ejus est ut claudat instar crumenæ, vesicam, & urinam defendat ab involuntario casu.

*Detrusor Urinæ.**Expansor
Urinæ.*

A mediâ vesicæ tunicâ nihil differt, & constat ex carneis fibris per longitudinem vesicæ transeuntibus, quæ mittendæ, quando placet, aut opus est, Urinæ inserviunt. Tonus ejus plurimum detrimenti capit, quando retentâ diutius quam par erat, urinâ, vesica plus justo distenditur ac dilatatur.

Cuent-





Cucullaris sive Trapezius.

O Ritur carneus ab inferiore parte Ossis Occipitis, & à ^{Motus scapulae diversimodè.} spinis vertebrarum Colli, & ab octo superioribus spinis Thoracis, cerniturque membranofus, latus, & extrinsecus decurrens versus scapulam angustior fit, inseriturque in ejusdem scapulae spinam quidem integram, ac dimidiam ejus basin, & in claviculae partem non contemnendam, nervosa, lata, carneaque Originatione, & sursum, deorsum, directè, vel in obliquum agitur, pro fibrarum, quibus undique cingitur, diverso motu situque & prout illa à spiritibus aut voluntari subjectis, aut temerè aut fortè fortunà actis diversimodè contrahuntur. Omnino divides hunc Musculum à pari suo juxta spinas vertebrarum, ubi ejus Originem ex multis unam diximus reperiri, deinde si ulterius prosequendo, separes eum diligenter ab osse occipitali, ubi illi prima & suprema Originationis superius est à nobis attributa, sic fiet, ut Musculi huic proximè subjecti facilius clariusque secanti se ostendant.

Levator Patientiae.

O ritur à Colli processibus transversis perpetuà serie, à secundo ad quintum, & totidem, nempe quatuor Originationes habet, ramusculorum instar, ut fieri solet, à se invicem disjunctas, quae deinde cum communi quodam scapo truncove coalescentes descendunt unà & adjungunt se integro lateri *Rhomboidis*, donec tandem inferantur scapulae in ejusdem supremâ infimâque parte, tendine lato simul & carneo, & scapulam trahentes sursum & antroorsum eodem visu brachium attollunt.

Rhomboides.

O ritur latus & carnosus statim sub *Trapezio* sive *Cucullari*, à spinosis processibus trium inferiorum vertebrarum Colli & superiorum Thoracis, unde tenuissimis instructus fibris versus scapulam deorsum pergit, & ejus integræ basi adjungit se extrinsecus, & ut in Origine, carneus & latus: Elevans hunc Musculum, cave nè, una eleves tendinem *ferrati postici superioris*, qui ei subtus adhæret. Quod autem Origines suas hunc Muscu-

lum diximus arcessere à ternis Colli vertebribus inferioribus, & à totidem superioribus Thoracis; & deinde in integram scapula basin inferi, ex eo fit, ut Cucullari sive Trapezio opituletur in eo motu, quo scapula retrorsum agitur versus inferiorem partem cervicis, & Thoracis superiorem.

Latissimus Dorsi sive Anisclaptor.

Abductor hic Musculus, qui etiam *Latissimus* à magnitudine dicitur, & unà cum pari suo propemodum contegit universum Dorsum, oritur initio lato & membranoso à spinis vertebrarum Thoracis inter Os Ileon & sextam Thoracis vertebra, ut à superiore parte Ossis Ilei, ubi ejus Originatio cernitur membranosa, sed cum pertigerit ad curvaturam costarum, carnis naturam induit, & ascensu angustior ac tenuior factus, transit supra scapulae angulum inferiorem, & inseritur brevi quidem sed lato nihilominus, atque forti tendine infra Ossis Humeri superius initium, inter Pectoralem & Rotundum. Cavebis omnino nè in elevando hoc Musculo in Originatione sua unà cruas Origines Musculi Subjacentis, qui *Serratus Major Posterior* nuncupatur; & nisi curam adhibeas in dissecando valdè diligentem, in elevando hoc Musculo ab Ileo cui firmiter adhæret, auferes unà particulam *Quadrati Lumbi*, & propè scapulam, sine consimili curâ, *Serrator Major Anticus* unà auferetur. Trahit Brachium pro vario situ, motu & contractione fibrarum, vel sursum, vel retrorsum.

Rotundus Major.

Oritur Initio carnoso ab inferiore angulo scapulae, cujus dimidiam partem emensus, destituit eam, & nonnihil supernè dilatatus, inseritur brevi lato atque forti tendine in eam partem Ossis Humeri ubi *Pectoralis* suam insertionem habet: Trahit brachium deorsum retrorsumque & jacet in aliquâ sui parte subaxillâ.

Serratus





Serratus Posticus Superior.

Musculus hic tenuis & exilis inseritur in Tergo, subter *Rhomboidem*, inter scapulas, & supra primum par Musculorum qui in Capite visuntur; Oritur autem tenuis & Membranosus à spinosis processibus trium inferiorum vertebrarum Colli, & à primâ vertebrâ Thoracis, & in obliquo itinere versus partem Thoracis maximè convexam, carneus fit, & insertus totidem diversis insertionibus in quatuor superiores costas, eas sursum trahendo, dilatat Thoracem.

Dilatatur
Thoracis.*Serratus Posticus Inferior.*

Cernitur latus, tenuis & membranosus, propè medium Tergum subter Latissimum sive *Aniscliptorem*; oritur autem à spinis inferiorum vertebrarum Dorsi, & à primâ vertebrâ Lumborum, & itinere transverso ductus, ad carnis naturam accedit, & inseritur totidem diversis insertionibus in quatuor inferiores costas, quas extrorsum vellicando, dilatat inferiorem partem Thoracis.

Dilatatur
Thoracis
partem inferiorem.*Sacrolumbalis.*

Situs est sub Serrato Postico inferiore, & Originem communem habet cum *Longissimo Dorsi*, cui etiam tam arctè adhæret externè & à latere secundum ejus longitudinem, quasi unus esset Musculus ex duobus factus, donec perveniant ad Duodécimam vertebram Thoracis, ubi iterum censentur in duos dissilire, ita tamen ut disseccando ab invicem dividi vix possint, & ibi Sacrolumbalis angustior & exilior factus, inserit se duplici Tendine, utroque itidem exili & angusto, in costas Thoracicas ad unam omnes, illic ubi illæ costæ incipiunt incurvari.

Optusulatur
priori in
dilatandis
Thoracis.

*Longissimus Dorsi.**Dilatator
Thoracis.*


Oritur perinde ab omnibus Ossis Sacri Spinis, & à vertebis Lumborum, ut & ab interiore parte Ossis Ilei, ubi Ossis Sacro conjunctus constituit primarium & princeps pars Musculorum: circà origines externè fortis & nervosus est, & nonnihil etiam acutus, internè autem carnosus, & ascendens inde, inserit se transversis processibus Lumborum, & fit carnosior quàm antè; sed pergens adhuc porro, fit angustior, & imperit Tendinem exilem & nervosum omnibus Thoracis processibus transversis, præter duodecimum, & definit plerumque in processu transverso primæ vertebræ Thoracis, quamquam, sed carenter admodum, insertio ejus ulterius producat in mammillarem processum:



Fig. 6



Fig. 3



Recti majores.

H quartum par Musculorum in collo constituunt, angusti, exiles, & carnosi, oriuntur autem à fibris finientibus secundæ vertebræ Colli, & ascendentes inde inferuntur in medium occiput, & tertio pari in motu opimulantur.

*Extensor
Capitis.*

Recti minores.

Hoc par sub *Rectis* majoribus constitutum, eandem habet formam & consistentiam & parallelos ductus: Oritur autem à tenui protuberantiâ quæ deprehenditur circundare primam vertebram Colli, & ascendentes inde, inferuntur ut *Majores*, sed nonnihil infra: *Majores* hi *Minores*que si totum par infimul & conjunctim agat, caput sursum inclinant, sin unus eorum singillatim operetur, motus fit à latere. Natura tot Musculos capiti exserendo extendendoque construxit, ut eo facilius homines contemplationi cœlestium vacarent, cui quidem motui feliciter peragendo, tenuitas Musculorum omnino necessaria est; nè autem fatiscerent diutinâ reclinacione, quasi capitis incumbentis mole pręgravati, ita naturâ comparatum est, ut longiores quidem Musculi breviusculis adjungerentur, diutinæ flexioni capitis, & retractioni ejus per angulos acutos, multò, quàm hoc par, accommodatiorēs.

*Adjuvat
prioris in
Commutat
motu.*

Obliqui superiores.

Hoc sextum par Obliquum à situ nominatum, invenitur sub *Rectis* de quibus proximè egimus, quibus etiam formâ respondent & substantiæ naturâ; tenues enim sunt ut suprâ de *Rectis* dictum est, & oriuntur ab externo latere *Rectorum* circa implantationes sive insertiones eorum, & obliquè descendentes inferuntur in processum primæ vertebræ Colli, si hujus paris uterque simul agat, Caput retrorsum fertur, motu directo, sin unus tantum, fit motus capitis retrorsum lateralis.

*Circum
alios
Capitis.*

Bambinus eas existimat oriri ab occipitio & desinere in processus laterales primæ vertebræ Colli.

Obliqui Inferiores.

*Adjuvat
potius in
Communem
motu.*

Hoc par inferius Oritur longiusculum, carnosum & exile à spinâ secundæ vertebræ Colli, & oblique ascendens inseritur, unâ cum *obliquis superioribus* in transversum primæ vertebræ processum: hi contracti circa spinam in Orbem feruntur, quæ sit ut caput super eas constitutum, moveatur ab iis motu quodam mixto medioque inter circularem & eum qui fit à latere; verum hæc duo paria obeundo muneri præ tenuitate propemodum inepta, adjuvantur ab extensoribus suprâ memoratis qui *Recti Majores Minoresque* dicuntur.

Transversalis.

*Extensor
Colli.*

Oritur à Transversis processibus sex superiorum vertebrarum Thoracis, & incrassescens inseritur extrinsecus omnibus Colli processibus transversis; unde & nomen etiam illi est ab Anatomicis inditum, hoc par si simul utrumque operetur, collum retrorsum agitur directo motu; si unus tantum agat sine adiutorio alterius, in eo casu flectitur oblique deorsum: inter hos transeunt nervi medullæ spinali à naturâ attributi, qui à vertebriis Colli originem sortiuntur.

Spinalis Colli.

*Extensor
Mittit.*

Oritur à radicibus spinarum septem superiorum vertebrarum Thoracis cum originibus benè multis, & in progressu sursum versus, tendinem nanciscitur à transversis processibus vertebrarum Colli, à singulis unum, pro numero vertebrarum, & firmiter implantantur in inferiorem partem integram secundæ spinæ, harum vertebrarum ubi dextri sinistrique Tendines concurrunt & propè coalescunt, non nisi per spinam à se mutuò separabiles. Hi unâ cum prioribus extendunt primò collum & deinde caput, vel motu directo, si conjunctim agant, vel obliquo, si divisim.

Splenius





Splenius seu Triangularis.

O Ritur duplex: Primò à spinis quartæ, quintæ, tertię, secundæ, & primæ vertebrarum Thoracis; secundo à spinis quinque inferiorum vertebrarum Colli, & longo latoque itinere progreditur, donec circa tertiam vertebra Colli utraque Originatio in unam compingatur, & uterque hujus paris Musculus fibris oblique transeantibus sursum vectus inferit se ipsum in medium Occipitii. Ut eum facilius clariſque in dissectione ostendas, elevabis eum, quam potes peritissime cautissimeque, in ipsis Originationibus ejus, & ita cultrum diriges inter ansulas ejus, quas inter spinas reperire est, ut & quam plurimas ansularum ferves, & Tendinam nè perdas Temerario cultri ductu. Hujus paris uterque in motu sociati Caput retrorsum agunt motu directo, divisus alter ab altero, lateraliter.

Complexus seu Triginus.

Videtur ex tribus Musculis constare coalescentibus in unum, initia præfert non pauca, partes & multas & nervosas, Originationem triplicem, unde *Trigeminus* nomen illi inditum est; primam à quarto & quinto transversis processibus vertebrarum Thoracis, unde confestim carnis evadens ascendit supra reliquas vertebra Thoracis, donec pertingat ad imam vertebra Colli, ubi Tendo fit rotundus, & inde non longe abest, quin iterum carnis speciem & naturam induit, & inferit se in medium Occipitii; secundam Originationem habet cum nervo brevi rotundoque à transverso processu supremæ vertebræ Colli, unde carne vestitus jungitur primæ, antè ejus in occipitio insertionem; Tertia Originatione carneam quandam speciem ostendit, & nervosam à transversis processibus primæ & secundæ vertebrarum Thoracis, unde oblique transiens extrorsum, post coalitionem cum priore, inferitur in radicem processus mammillaris, & impertit ansulam singulis Colli processibus transversis: Ut hunc Musculum feliciter invenias & ostendas, divides omnino latera tum *spinalis*, tum *Longissimi Dorsi*, quo ejus Originatione clariùs elucescat.

Quadratus.

Sic dictus à Quadræ similitudine; Oritur à posticâ parte & superiore cavitate Ossis Ilei, ut & à superiore parte Ossis sacri, latus crassus, & carnosus, & inde ascendens supra vertebra Lumborum adhæret intus eorum processibus transversis, & inferit se angustior & carnosus interno lateri Duodecimæ Costæ, & prorsum ciet vertebra lumborum; quod si unus tantum agat à socio suo disjunctus, fit motus Lumborum versus latera prorsum & oblique.

PRÆLECTIO. QUARTA.

Humeri
Elevator.


O Ritur ab integrâ basi scapulæ suprâ Spinam carnosus, adimplens totam cavitatem quæ inter Spinam est & scapulæ supremam costam, unde retrorsum actus versus collum ejusdem fertur sub secundo ligamento Ossis Humeri, eodem modo quo *Biceps*, & inseritur obliquè tendine, lato & forti in collum Ossis humeri, & unâ cum *Bicipite* circumagitur brachium, quanquam nonnulli statuunt usum ejus unâ cum *Deltoides*, qui illi se in motu socium adjungit, in attollendo Brachio versari.

Humeri
Elevator.

Infraspinalis, sive super-scapularis inferior.
O Cooperit scapulæ exteriorem partem, quæ quidem sub spinâ cernitur, universam, & oritur ab integrâ propemodum basi scapulæ inferioris, & obrinens cavitatis istius partem plusquam dimidiam, carnoso itinere retroactus angustat seipsum pro modulo partis cui applicatur, ut eraptor & congruentior fiat, & inseritur, ut aliquibus videtur, lato tendine in ligamentum Ossis humeri, sed mihi tamen longè vero similiùs videtur (cum eorum pace dictum sit qui priori sententiæ patrocinium ferunt) hunc Musculum prout situs indicat, *Deltoides* & *Coracobrachialis* musculus in attollendo Ossè humeri opitulari.

*Octavus Casserini.*Elevator
Humeri.

O Ritur cum brevi nervosâque originatione à scapulæ processu *Coracoidali*, haud ità longè ab eo loco unde *Deltoides* originem arcessit, unde in descensu longiusculus fit & unâ largus & carnosus, & inseritur forti Tendine in meditullium Ossis humeri, quod quidem cum *Pectorali* Musculo in motu sociatus adducere prorsum censetur versus pectus: Venter ejus rimâ perforatur, & per corpus ejus transit nervus quidam qui cæteris Musculis humeri motoribus plurimum adjumenti præstat. Musculus hic, si me audias, *Deltoides* adjutor est, in Brachio flectendo & in attollendo Ossè Humeri.





Teres minor.

Oritur acuminatus & carnosus à scapulæ angulo inferiore, ad ipsam basin ejus carnosior usque ad ejus ventrem, & inferitur acuto tendine in collum *Os Humeri*. Usus ejus in *Os Humeri* depressione veritur, oppositus quoad usum *Deltoidi* & *Coracobrachiali*. *Depressor Humeri.*

Subscapularis.

Situs in cavitate scapulæ possidet eam integram, & quasi suo jure sibi vendicat; Oritur carnosus ab integrâ internâ basi scapulæ, & sic progrediens & pro scapulæ mensurâ & modulo angustior factus, inferitur lato tendine in tertium ligamentum *Os Humeri*, & Brachium introrsum ducere perhibetur. *Humeri Depressor introrsum.*

Biceps.

*Biceps.*Cubiti
Flexor.


O Ritur ab initio Duplici, unde & Nomen fortitur, primò extrinsecus à supremâ parte Acetabuli *scapularis* ejusdem ubique substantiæ, & transit sub ligamento commissuræ, quæ scapulam ipsius Acetabulo committit, supra caput *Ossis humeri*, & per canalem sibi à Naturâ attributum, in cuius termino definit & vincitur ligamento sibi proprio ac peculiari. Secundò oritur latus, carneus & nervosus à scapulæ *processu Coracoidali*, & transit internè per summitatem *Ossis humeri*, & in descensu jungitur cum socio, ita ut uterque Musculus in unum coalescat, eundemque fortem & carnosum, & exilior in progressu factus, sit Tendo fortis, crassus, longus, & nervosus, & inseritur in processum quendam sive prominentiam oblongam sub *Radii* initio superiore, & *Cubitum* unâ contrahit & attollit.

*Brachialis externus sive Gemellus major.*Cubiti
Extensor.

Originem duplâ præfert, latus & fortis, partim carneus, partim nervosus, primò ab inferiore parte scapulæ, ubi cavitatem habet sibi peculiarem paulò infra collum ejusdem, & carne stipatus descendit, & jungit se ipsum interno lateri *Ossis humeri*, ubi occurrit secundæ originationi carnosæ, & cum eâ in unum omninò Musculum coalescens, deorsum fertur ad interius latus *processus Olecrani*, ubi etiam indispiscitur insertionem suam; Musculus hic *Cubito* extendendo, inservit, & *Bicipiti interno* in movu est contrarius.

*Brachialis internus.*Flexor
Cubiti.

Oritur circa medium *Ossis Humeri*, propè insertionem *Deltoidis* & *Pectoralis* duplex, latus & carnosus, cum juxtâ externum, tùm internum latus ejusdem *Ossis* cui statim junctus & firmiter adhærens, in descensu ampliatur; & inseritur tandem latus & carnosus tam in articuli ligamento, quam in appendicibus *Cubiti*, & *Radii*: Hic cum *Bicipite* in opere conjunctus valdè contrahit, & constringit *Cubitum*, & eâdem operâ eundem attollit.






Fig. 1.

Anconans.

Oritur ab internâ & posticâ parte *Ossis Humeri*, inter *Ulnarem Radialemque* situs, & inseritur cum Tendine nervoso nonnunquam obliquè & lateralitèr in ulnam, ad pollicis longitudinem infra *Olecranon*, & symbolam confert Muscùlis Duobus proximè descriptis ac delineatis in *Cubiti* extensione.

Entroste
Radiation

Novus Humeri Placentini.

Oritur acutus & carnosus ab inferiore angulo *Scapulae* ad basin ejus, & carnosior factus in progressu ad ventrem suum, iterum angustatur & inseritur acuto tendine in collum *Ossis Humeri*, cui deprimendo censetur inservire.

Humeri
Depressor

I 2

Palma.

*Palmaris.**Humeri
depressor.**Extensor
digitorum.**Extensor
digitorum.*

O Ritur rotundus & nervosus ab internâ extuberantiâ *Ossis Humeri*, deinde carneus evadens & angustus, fertur nonnihil oblique ad medium cubitum aut circiter, & definit in tendine longo & rotundo, & transiens supra *Radiale* ligamentum internum pertingit ad palmam, ubi se ipsum explicat in tendinem latissimum, & à latere se inserit in articulos primos digitorum, & tam arcte adhæret eorundem cuti, ut in de se ægrè divelli patiatur, quæ quidem cutis interius contracta facit ut manus apprehendenti similis in se ipsam vertatur, & palmæ sensationem acutissimam & exquisitam impertit.

Caro musculosa Quadrata.

Oritur à membranâ carnosâ subter *Montem Lune* ubi octavum os carpi collocatur, & inde porro transiit sub *Musculo Palmari*, usque ad medium ipsius palmæ, & inseritur ab externo latere tendinis istius qui minimum Digitorum dividit à majoribus: hæc manum excavat, & usus ejus potissimum ostenditur in palmæ contractionibus; in quibus trahitur ab eo *Mons* ille Anatomicus qui *Lune* sacer est, versus medium volæ.

*Radialis.**Carpi
Flexor.*

Oritur ut prior ab eâdem utique extuberantiâ membranosâ, & inde transversim delatus propè exteriorem partem eorum Musculorum qui *Primi Digitorum flexores* nominantur, infigitur confestim Radio & priusquam in progressu pertigerit ad Carpum, induit se formâ tendinis rotundi qui adhærescens transverso ligamento, sub eodem transit, in latitudinem auctus, & inseritur in istud os Metacarpii quod è regione medii digiti collocatur, & motu suo manum contrahit & constringit.

*Extensor
digitorum.**Ulnaris.**Carpi
Flexor.*

Oritur acutus, carneus, & nervosus ab interiore *Conspicitur*, *Ossis humeri*, & sic decurrens carneus ubique per integram Cubiti, cui adhærescit, Longitudinem, inseritur Carpo in ejus quarto Osse, partim carneâ substantiâ constans, partim nervosâ; non autem defertur, ut proximè supra de Radiali ostensum est, sub transverso ligamento, sed involutus tantum & implicitus communi Musculorum omnium membranæ motu suo Carpum contrahere reperitur.

Extensor

Fig. 1



Fig. 2





Extensor Radialis primus.

Oritur ab ea Brachii parte, quæ, circa medium cernitur extrinsecus acuminata initio lato simul & nervoso, ubi carne stiparior pergit. Juxta Radium per longitudinem ejus, & medium itineris sui spatium permenſus tendinem præfert firmum & robustum & confectim inferitur cum tendine duplici ſive diſpartito, qui unus modo erat, diſſiliente in duos, in primum & ſecundum oſſa Metacarpii, & officium ejus, cui eſt ob-
tundo a naturâ deſtinatus, in extenſione Carpi collocatur.

Carpi Ex-
tenſor.*Extensor Radialis ſecundus.*

Oritur ab internâ Appendice Brachii, ut & à ſummo cubito, & dilatatus in tranſitu per Cubitum ſecundum ejus longitudi-
nem, propè Carpum, deſinit in Tendine longo & rotundo, cu-
jus miniſterio inferitur in ſinum quendam paulò ſuprà infimum
Cubiti appendicem, & in ſupremam partem iſtius Metacarpi
Oſſis, quod è regione *minimi Digiti* invenitur.

Carpi Ex-
tenſor.

Perſo.

*Perforatus sive Flexor secundi Internodii Digitorum.**Flexor se-
cundi In-
ternodii
Digito-
rum.*

O Ritur ab internâ Apophysi Ossis Humeri, sub priore, unde paulatim dilatatus & carnis naturam ac speciem præ se ferens, circa medium *Cubiti & Radii*, cui nonnihil adhærescit, pergit porro & fit juxta *Radium* carneus & rotundus, ibi autem tribuitur in quatuor partes carnosas, à quibus totidem tendines oriuntur, qui omnes involvuntur in tunica quâdam tenui & mucosâ, & sic, internè transeuntes subter ligamentum & prætervecti palmam, impertiunt primo & secundo Internodiis quatuor digitorum tendines quaternos, foraminulis pertusos juxta insertiones, ut in se recipiant & transmittant tendines *Flexoris Tertii Internodii*.

*Perforans sive Flexor Tertii Internodii Digitorum.**Flexor ter-
tii Inter-
nodii Di-
gitorum.*

Oritur membranofus ex aliquâ sui parte ab eodem processu quo *Perforatus* & alibi à radice anteriori processus Olecranii, unde postmodum, ad Cylindri speciem accuratissimè compo-
tus, transit carnosâ facie sub priore & intrinsecus quidem *Cubito* adhæret, extrinsecus vero *Primo Flexori pollicis*, & in descensu circa medium *Cubiti*, dividit se planè ut suprâ de *Perforato* dictum est, & per fissuras ejusdem tendinibus transversis mi-
grat, qui quidem tendines, præstitutos sibi à naturâ terminos feliciter emensi, inferuntur tandem in tertios articulos quatuor Digitorum & eisdem suo motu contrahunt & constringunt.

*Lumbricales sive Flexores primi Internodii.**Flexores
primi In-
ternodii.*

Hi Musculi, ut ubique reperiuntur in progressu tenues & angusti, irâ etiam oriuntur longi, rotundi, & exiles sub iisdem membranis, quibus id muneris obigit in corpore humano ut involvant tendines *Flexorum Tertii Internodii*, unde migrantes habitu carnosio, inferuntur tendine nervoso & rotundo in primos quosque articulos quatuor Digitorum & optimè ostenduntur inter disseccandum, si originibus cultro elevatis, parcas insertionibus & sinas eas incolumes manere officium *Lumbricalium* in digitis lateraliter inflectendis versatur.



Flexor primus primi Internodii pollicis.

Oritur carnosus à superiore Regione *Ligamenti annularis* quæ Flexor primus primi Internodii pollicis.
est in *Carpo* juxtà pollicem, & in ascensu pertingens ad primum
& secundum pollicis articulos, inseritur in Caput primi articuli
carnosus.

Secundi Internodii pollicis Flexor primus.

Oritur latus, tenuis & carnosus ab isto Osse *Metacarpi* quod Flexor secundus Internodii pollicis.
jungitur Indici paulò infra ejusdem Caput & versus pollicem
procedit itinere ad trianguli formam accedente & inseritur
tendine membranoso in Caput secundi articuli pollicis ab eà
parte quæ indicem proximè attingit.

Secundi Internodii pollicis Flexor alter.

Oritur rotundus & carneus ab Osse *Cubiti*, & juxta *Radium* Secundus Flexor pollicis.
pergens cui adhærescit, ut & membranæ quæ *Cubitus Radii*
conjungit, adsequitur *Carpum*, ubi tendinem refert rotundum
& nervosum, involutum membranæ tenui & mucosæ, & inde
porrò transiens inseritur in itineris sui metâ in secundum arti-
culum pollicis tendine latiusculo.

Digitorum secundi & tertii Internodii Tensor communis.

Oritur partim carnosus, partim nervosus ab externo brachii Tensor communis secundi & tertii Internodii Digitorum.
processu, & carnosior evadens descendit inter duos *Extensores*
Carpi, deinde angustior factus, dividit se ipsum in tres rotundos
tendines, in communi quadam tunica tenui mucosâque inclu-
sos, & sic sub ligamento annulari transeunt, quod simul ac cer-
nuntur prætervecti, abeunt à se mutuo, ut amici valedicentes &
in ramos quosdam dispersi inserunt se ad secundum & tertium
articulos, in digitos indicem, medium & tertium.

*Primi Internodii Extensores,**Extensores
primi In-
ternodii.*


ORiuntur carnosi, rotundi, longi & exiles ab ossibus Me-
tacarpi & inde transeuntes ad radices digitorum, late-
raliter inseruntur in primum & secundum articulos eo-
rundem & elewantur sicut *Flexores Primi Internodii*, hi Musculi
circa origines contracti, secundum & tertium articulos digito-
rum, interosseis in societatem operis venientibus, suâ ipsorum
contractione extendunt, & si necessitas postulat, opitulantur
etiam digitis in obliquo motu.

*Indicis Abductor.**Indicem
abducens.*

Oritur ab initio carnoso à *Cubiti* medietate, & inde obliquè
vectus ad appendicem *Radii* diffilit in binos Tendines, qui
per sinum sibi in eadem appendice peculiarem & proprium,
devehuntur sub *annulari ligamento* supra Metacarpum, & supe-
rior quidem tendo fertur ad minimi digiti radicem, inferior
inferitur obliquè in radicem digiti secundi, abducendo nimi-
rum pollicis à naturâ destinatus, & jungitur secundis & tertiis
extensoribus inferiorum articulorum.

*Secundi & Tertii internodii Pollicis Tensor**Secundi &
Tertii pol-
licis ten-
sor.*

Oritur ab eadem *Cubiti* parte quâ prior, & ascendit obli-
què supra *Radium*, & dividit se ipsum in duas partes inæqua-
les, sed sibi mutuo nihilominus arcè adhærescentes, & fer-
tur in ductu quodam sibi peculiari juxta *Radii* appendicem,
& superior quidem pars ejus aliquantulum carnosa, tandem
exit in rotundum tendinem, & inferitur in os Carpi pollicis re-
cipiendo factum, inferior vero statim subversa in duo carnis
quasi frustula vel ossas, hæc postmodum induunt speciem tendi-
nosam, & prioris quidem tendo inferitur in primum pollicis
internodium, posterior, membranæ adminiculo, in articulos
ejusdem secundum tertiumque.



Minimi Digiti abductor.

Situs est in imâ manu è regione minimi digiti, brevis & fortis, oriturque carnosus à quarto Carpi osse, & deinde extendens se ipsum per *Metacarpi* longitudinem, inseritur in latus exterius primi articuli digiti minoris, quem à cæteris digitis abducere reperitur, maximè verò, quando Sphærica quæcunque sunt, manu apprehenduntur.

*Minimi
digiti ab-
ductor.*

Minimi Digiti Tensor.

Oritur acutus & nervosus ab eâdem parte quâ prior, & dimidium itineris sui habet cum abductore commune, quasi Musculus uterque coalesceret in unum, postea verò quàm pertigerit ad ligamentum transversum, tendo fit Cyllindricus, durus & nervosus, qui inseritur in primum, secundum, & tertium articulos minimi digiti.

*Tensor mi-
nimi Digiti.*

Pollicis adductor.

Medius reperitur inter Pollicem & Indicem, & oritur carnosus ab externâ & posticâ parte istius *Metacarpi*. Ossis, quod Indici sustinendo inservit, & inseritur carnosus & latus interno lateri pollicis ad articulum primum, & censetur ejus usus & officium in pollice versus Indicem adducendo versari.

*Pollicis ad-
ductor.*

Pronator Quadratus.

Oritur ab inferiore & internâ parte *Cubiti* propè *Radium*, transversim vectus supra ligamentum quod *Radium* *Cubito* committit, & deinde inserit se ipsum carneus & latus in *Radii* partem internam, similis per omnia quadræ Mathematicæ cujus omnes lineæ, si ad amissim vel normam exigantur, reperientur sibi mutuò longitudine parës.

*Pronator
Radii.*

Pronator Radii Teres.

Oritur à radice internæ Apophyseos Ossis humeri, & ab interno latere Ossis cubitalis, ubi *Radio* jungitur originatione carneâ & satis amplâ, & exinde descendens obliquè juxtâ ejus latus internum, quando paulò ultra ejus medium pertigerit, inseritur ibidem carnosus, sed emergit iterum, velut urinator quidam & nervi speciem dissecantibus præbet, qui inseritur in *Radii* Caput externum & eum deorsum cogit.

*Pronator
Radii Teres.*

*Flexores Primi Internodii sive Lambricales.**Flexores
primi In-
ternodii,*

HI Musculi tenues ubique & angusti, oriuntur Cylindrici, longi & exiles ab iis membranis quæ tendinibus *Flexorum tertii Internodii* præstant officium & vicem involucri, & inde porro pergentes tramite carnosio, inferuntur tendinè rotundo nervosoque in primum quemque articulum quatuor digitorum, & optimè ostenduntur elevando originationes, & insertiones eorum liberas relinquendo. Eorum usus in digitorum flexione laterali situs est.

*Flexor pol-
licis.**Flexor primus primi Internodii Pollicis.*

Oritur carnosus à superiore regione Ligamenti annularis, quæ in extremo Carpo juxta pollicem cernitur & ascendens inde circuit primum & secundum pollicis artculos, & inseritur carnosus in articulum ejus primum.

*Pollicis Abductor.**Abductor
pollicis.*

Oritur nervosus propè *Flexorem primi Internodii Pollicis* ab interiore nimirum parte istius Ossis, quod sustinendo pollicis deservit, & exinde carne stipatus obductusque inserit se ipsum tendine membranoso in primum articulum pollicis & abducit eundem à digito minore.

*Interossei.**Extensores
digitorum.*

Hi vulgò statuuntur numero Octoni, substantiâ carnosî, formâ longi & exiles, oriuntur autem ab ossibus Metacarpi, & transeunt per eorum longitudinem integram, & ad radices digitorum, tendinum naturam atque speciem habent lateraliter insertorum, à primo ad secundum articulum eorundem, ita tamen ut eorum seni inserti reperiantur in tres artculos ossium Metacarpi, hi omnes in motu communi sociati, faciunt extensionem digitorum perfectissimam, extendunt enim secundum & tertium os Metacarpi, quo fit ut extensore digitorum faucio, nondum tamen extensio eorundem eo ipso protinus aboleatur, & in omni contractione digitorum, primus eorundem articulus ab Interosseiis extenditur, si ulla vel adductio vel abductio fiat.

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig 1




Fig 2



Supinator Radii brevis.

Hic Musculus brevior & exilior quam *Longus*, oritur ab <sup>Manu 2^a oritur in-
ter.</sup>exteriore parte istius ligamenti quod firmat ac ferrumiat inferius Caput Ossis humeri, ut & etiam à processu Cubitali, dein obliquè transiens (externe membranoso ductu, intrinsecus carnofo) attingit *Radii* medietatem, cui firmiter insertus & implantatus pollet virtute manum in inferiora cogendi.

Supinator Radii Longus.

Oritur à medio Ossis Humeri & obliquè transiens supra <sup>Manus
Radium
anterior.</sup>*Radium*, ubi ad ejus infimam partem transcundo pertigerit, fit Tendo membranofus, & applicatur superiori parti Appendicis ejusdem *Radii*, eumque cogit aliquantulum introrsum si hujus paris uterque contrahatur versus originationem eorum, fit *Radii* motus antrorsum, ut & etiam manùs ipsius, quæ *Radio* in extremâ sui parte alligatur, beneficio *Carpi*.

*Si Femur à Corporis Trunco Sejungas, dividendo os Ileon ab osse
Sacro, Sequentium Musculorum dissectio Melius
peragetur.*

PRÆLECTIO QUINTA.

Iliacus Internus.

Procedit ab integrâ spinâ Ossis Ilii, semicircularis, latus,
& internè carnosus, dein angustior & crassior tendinis
naturam atque speciem habet, & per eundem sinum
transiens, quem pertransit *Psoas*, inseritur in eundem Rotato-
rem, sed paulò inferiùs, hic cruribus directè contrahendis inser-
vit, quando crura sursum flectuntur.

Psoas seu Lumbaris.

Oritur lividus & carneus à lateribus corporum duarum ex-
tremarum vertebrarum Thoracis, & à tribus supremis vertebris
Lumborum, & ab eorundem processibus transversis, descen-
dens rotundiusculus ab internâ parte Ossis Ilii usque ad os pu-
bis, ubi fit Tendo fortis & rotundus, & ubi pertransierit sinum
ejus, inseritur in minoris Rotatoris partem superiorem, & offi-
cium ejus collocatur in attollendo crure & simul inflectendo
introrsum.

Psoas parvus.

Oritur carneus & postquam porrexit ab Origine suâ per
longitudinem circiter digiti minoris, dilatur suprâ Psoadâ
in tendinem tenuem & levem & desinit in Psoade & Ileo quæ
firmiter amplexatur. *Gulielmus Molinæus* disseccandi peritiâ in-
ter paucos clarus & à me certè cum ob eximias dotes, tum
propter amicitiam, quâ me prosequitur, planè singularem, nun-
quam sine honoris præfatione nominandus, cùm in Aulâ no-
strâ Chirurgorum Londini Magistri Anatomix officio fungere-
tur, hunc Musculum in eo corpore deprehendit, quod tum tem-
poris ab eo pro muneris sui ratione solenniter dissectum est.

TAB XXVII

Prælectio Sexta



Gluteus major.

Oritur ab integrâ spinâ Ossis Ilei, externè, dein ab inferiore parte *Ossis Sacri* à latere ejusdem, & tertio ab osse *Femoris
exterioris.*
Coxendicis, amplius & carnosus & obliquè decurrens
suprà juncturam Ossis Coxendicalis, ubi angustior evadens,
inferitur tandem tendine forti & lato in primam impressionem
Rotatoris magni & partim etiam in lineam asperam, usus ejus in
extendendis cruribus versatur, tum autem crura dicimur ex-
tendere quando ea movemus extrorsum.

Gluteus medius.

Oritur sub priorè, sinu, & magnitudine planè geminus ab an- *Extensor
femoris.*
teriore parte spinæ, ut & à posteriore *Ossis Ilei*, carneus, latus, &
semicircularis, & in obliquo descensu angustat seipsum, & co-
operit juncturam coxendicis ut prior, & inferitur transversim
lato, forti & membranoso tendine in quartam impressionem
Rotatoris magni. Hic si me audias, opitulatur priori, & deprimit
os Femoris à *Psoæ & Iliaco interno* elevatum.

Pyriformis.

Oritur crassus & carnosus à tribus inferioribus vertebra *Extensor
Rotator.*
Ossis Sacri & transversim actus fit tendo rotundus & inferitur in
quartam impressionem *Magni Rotatoris*. Femur ab eo trahitur
fursum, extrorsum & retrorsum, hic Musculus abundat fibris
pulchrâ & admirabili texturæ varietate distinctis, ut motus tam
ab invicem diversi eò facilius feliciusque peragantur.

Marsupialis.

Oritur carneus & amplius ab internâ parte istius membranæ, *Extensor
Rotator.*
quæ contegit magnam pertusionem *Ossis pubis* & simul contegens
integram faciem extremam istius Ossis & Coxendicis, angustior
fit, & emittit ternos aut quaternos tendines qui transeunt per
sinum Coxendicis, qui quidem sinus secundum longitudinem
suam a forti ligamento arcuatâ quâdam specie jungitur à ter-
go, externæ parti coxendicis, ubi tendines isti velut in Marsupio
quodam repositi & in unum eundemque tendinem coalescentes
inferuntur in sinum *magni Rotatoris*, & faciunt rotationem ex-
ternam; hunc musculum in dissectione, intrinsecus elevabis,
dirigendo cultrum sub ligamento in sinum ipsum, ut eo clariùs
Marsupium elucescat.

Triceps.

Femoris
adductor.

Oritur ab initio triplici, & primo quidem carnoso & nervoso ab appendice Coxendicis, ubi tumefactus infinnuat se ipsum in latitudinem auctum in partem posticam femoris; deinde attenuatus terminatur in rotundo Tendine ad Ossis Femoris internum Caput. Secunda illi Originatione contigit ut prior, itidem carnosa, ab osse Coxendicis ubi jungitur Pubi & terminatur ad radicem inferioris Rotatoris in supernâ parte asperæ lineæ. Oritur denique ut primâ & secundâ sic & tertiâ vice ubique sui similis & ubique carnosus ab inferiore parte coxendicis, & inseritur in lineam albam Ossis Femoris quibus nonnulli quartam originationem addidere, cujus ramusculum à formâ *Pectinalem* dixere, verum ille mihi potius videtur ad hanc tertiam originationem pertinere, quam constituere ab eo ramum quendam aut Musculum distinctum. Trahit crura intrinsecus & equitem valdè juvat, ut in equo sedeat firmus & immobilis, potest non invenuste Musculus pudicitiae dici, utpote qui *Livido* opitulatur in cruribus introsum trahendis.


Obturator externus.

Rotator
femoris
externus.

Nomen sortitur ab origine, oritur autem ab anteriore parte cavitatis istius, quæ os pubis & Ischium interjacet, quam unâ cum Obturatore interno adimplens & obturans, exinde illi inditum est Obturatoris nomen, ab origine autem transversim delatus versus cruris partem posticam angustior fit, & inseritur forti tendine in sinum Rotatoris magni & administrat internam rotationem.

Inter dissecandum diriges cultrum introsum versus marginem perforationis Ossis Pubis ut eo evidentius clariusque ostendatur.

Pecti-



Pectinalis, sive Lavidus.

O Ritur latus & carnosus ab interiore parte *Ossis Pubis*, ^{Interioris} juxta cartilaginem ejus, descendit autem obliquè & in- ^{Extensor} ^{Femoris.} feritur tendine largo & brevi interno lateri *Ossis femoralis* circa ejus medium, quo fit ut erus ab eo fortiter trahatur sùsum & introrsum.

Membranosus.

Originem acutam habet, externè nervosus, internè carneus ^{Extensor} ^{Femoris.} à spinâ *Ossis Ilei*; ab eâ parte quæ *Sartorio* proxima est, deinde latus fit & cum nervositate quâdam membranofus, & recipit in cavitatem suam crurales musculos in universum omnes deinde cooperiens. *Patellam* & *Obturatories duos* in externâ sui parte, inseritur ibidem, & extendit femur directè.

Sartorius.

Oritur acutus, carneus & nervosus ab anteriore parte spinæ *Ossis Ilei*, dein carneus & latus transit obliquè introrsum suprà musculos crurales, & ad internum appendicem *Ossis femoris*, ^{Adductor} ^{Femoris.} lati cujusdam tendini aspectum præbet, & inseritur ut alii volunt, lato, ut alii, rotundo tendinis in *Tibiam*; hic musculus anteit longitudine ceteros ferme omnes, quocunque in humano corpore reperiuntur, & est certissimus adductor femoris.

Gracilis.

Oritur largus & nervosus à medio *Ossis Pubis* secundum longitudinem cartilaginis ejus, & sic descendens introrsum & carnosâ facie versus *Popliteum*, ibi compingitur in tendinem rotundum juxta interius Caput *Ossis femoris*, & inserit seipsum in *Tibiam* juxta *Sartorium*. ^{Flexor} ^{Femoris.}

Rectus.

Tibiae Ex-
tensor.

Oritur acutus & nervosus à tenui quâdam & internâ ex-
tuberantiâ *Ossis Ilei*, deinde pergens carneus & Cylindricus, cum pertigerit ad *Patellam*, expandit seipsum in
tendinem latum & fortem, qui *Patellam* penitus absorbet & ab-
scondit, & deorsum vectus, inseritur in externam partem *Tibiae*,
ad prominentiam quandam eî à naturâ destinatò factam.

Vastus Externus.

Tibiae Ex-
tensor.


Oritur latus & nervosus à radice magni *Rotatoris*, adhærescens
superiòri & externæ parti *Ossis femoris*, & in descensu versus
Patellam carneus, & ubi ad *Patellam* pertigerit, refert ibi tendi-
nem latum & membranofum, & cum membranâ *Recti* coale-
scens commune operculum *Patellæ* facit, & inseritur planè ut
suprà de *Recto* dictum est.

Vastus Internus.

Extensor
Tibiae.

Oritur nervosus à parte aliquâ *parvi Rotatoris*, & à collo
Ossis femoris, & carne obvoluntis adhærescit anteriori & inte-
riori parti ejusdem *Ossis*, & ubi ad *Patellam* pervenerit, coale-
scit cum *Recto*, *Vastoque Externo*, & *Patellam* unà cum iisdem
involvit, & inseritur ut illi solent.

Biceps.



Biceps.

Oritur acutus & nervosus ab appendice coxendicis, & per ejus externam superficiem in obductus decurrit, & postquam stadii sui dimidium percurrerit, attenuatur & mediam naturam habet inter tendinem & nervum, ubi jungit se, velut ex condito, secundæ Originationi quæ ab Osse femoris proficisci cernitur, illic inseritur *Glutæus major*, unde intumescens & nervi speciem extrinsecus præ se ferens representat ilico tendinem robustum, & transit per externum sinum extimæ superficiei *Ossis femoris*, ubi os istud originem suam sortitur, & inserit se firmiter externo lateri superioris appendicis *Fibulae*. Aliquando hic Musculus, duplex exinde à *Vesalio* dictus, duplicem & originationem & exitum præbet, & usus ejus in contrahendo crure, & in eodem retrosum cogendo collocatur.

Semimembranosus.

Initium sumit ab origine tenui & membranosa, & deorsum transiens per postica femoris, per dimidium itineris progreditur membranofus, dein autem carneus & crassus inserit se ipsum tendine rotundo in *Popliteum* in *Tibia* supremâ & internâ.

Seminervosus.

Oritur lividus, latus, carneus & semicircularis, ab inferiore & postica parte Ilei juxta acetabulum Coxendicis. Et transiens oblique & prorsum & copioso fibrarum satellitio interstinctus secundum longitudinem ejus Ligamenti, quod femoralis Ossis initia constringit, inseritur lato & robusto Tendine in tertiam impressionem *Magni Rotatoris*. *Glutæi* omnes quasi fœdere sociati, in motu flexoribus opposito conspirant, hoc est in attrahendo deorsum & retrorsum osse femoris, quod illi sursum antea traxerunt.

Quadrigenus.

Oritur carneus ab origine Ossis Ilei, & ab appendice coxendicis, & transit latus, brevis & carnosus versus posticam partem *Rotatoris magni*, & inseritur in osseum intervallum quod interjacet duos *Rotatores*; ut hujus Musculi, & *Obturatoris externi* origines & progressus clarius ostendas, Caput *Lividi* & partem aliquam *Tricipitis* cultro aperiri ac denudari curabis.

*Gastrocnemius externus.**Extensor
Tarsi.*

O Ritur latus & carnosus ab interno capite *Ossis femoris*, ut & ab externo capite ejusdem, & sic descendens uterque ab origine suâ circa medium itineris in unum coalescunt, & compinguntur in unum latum, fortem, & nervosum tendinem, cum tendine *Gastrocnemii Interni* coalescentem, qui inserit seipsum in posticam partem *Ossis calcis*, ita ut reverâ in duplici originatione non nisi unus musculus cenferi debeat.

*Plantaris.**Extensor
pedis.*

Oritur carnosus, tenuis, & rotundus sub priorè, ab externo & inferiore termino *Ossis femoris*, unde paululum dilatatus porrigitur in tendinem exilem & rotundum, transiens obliquè ab externo inter *externum internumque Gastrocnemios*, introrsum, & cum eorum tendinibus juxta calcem sociatus pergit, porrò à latere ejusdem calcis, donec inserit seipsum (post dilatationem supra soleam sive plantam pedis) in omnes digitos pedis ad eorum primum internodium. Sed neque dilatatio hujus Musculi supra plantas, neque insertio, quæ est in pedum digitis reperietur, nisi quæras insertionem ejus in *Flexore primi Internodii* juxta originationem ejus in cavitate *Ossis calcis*. Hic Musculus pedibus tantundem præstat, quantum manibus, qui dicitur, *Palmaris*.

*Gastrocnemius Internus.**Obliquus
Extensor.*

Oritur lividus, fortis, & nervosus, à posteriore appendice *Fibulae* & in progressu dilatatus adhærescit eidem & *Tibiae*, deinde descendens, postquam semissem sui spatii confecit, coalescens utique cum *Gastrocnemio externo* & in origine suâ & in insertionè, & hi quidem tres Musculi proximè percensiti circa insertiones suas omnes in unum compinguntur, & nomen sibi vendicant *Magnæ Chordæ* quæ vel saucia vel contusa si Hippocrati fides, periculosa semper est, nonnunquam & lethalis, cujus sententia ex eo non levitèr adstruitur & affirmatur, quod experienciâ compertum sit, si inflammatio ulla in hac parte contingat, totum corpus, particeps doloris, ilicò febriculâ sollicitari.

*Subpopliteus.**Obliquus
mover
pedem.*

Oritur latus & nervosus ab externo capite *Ossis femoris*, & carne obvolutus transit obliquè ad posticam & internam partem superioris appendicis *Tibiae*, & inseritur ibidem, hic *Tibiam* movet obliquè extrorsum, pedem verò nonnihil introrsum cogit.

Tibialis

Fig. 1.




Fig. 2.





Fig. 2.

Fig. 1.



Tibialis Anticus sive Musculus Catena.

Hic Musculus oritur acutus & carnosus à superiore appendice *utriusque obturatoris* prorsum, ut & à ligamento quod connectit eos, tum paululum dilatatus mox iterum in angustias cogitur circa medium *Tibiae*, & fit Tendo fortis & rotundus transiens obliquè suprà *Tibiam*, & subter *Ligamentum annulare* & inseritur intra os *Tarsi* è regione *Offis Pollicis*.

Tibialis posticus seu Nauticus.

Oritur carnosus à ligamento quod *Tibiam Fibulæ* conjungit, secundum earum longitudinem, & ab utroque isto osse retrorsum actus, fit tendo rotundus juxta malleolum internum, ubi constrictus forti ligamento malleolum eundem involvit, & quando pertigerit ad plantam pedis, inseritur in partem inferiorem *Offis Tarsi* ubi jungitur *Offi Cubiformi*: Nonnunquam in duos tendines abire cernitur, quorum unus inseritur in os *Naviculare*, alter in os *Innomiatum*. Nauticus vulgò dicitur ab usu quem Nautis præstat, quando scandunt antennis.

Peroneus primus sive Fibularis.

Oritur nervosus à superiore appendice *Fibulae*, & descendens inde adhærescit extimæ ejusdem parti, extrà rotundus, internè lividus, in ipsâ musculi substantiâ rubicundus, & circa medium viæ in tendinem transmutatur, obliquè & retrorsum transeuntem per sinum sub *malleolo externo*, & inseritur in Radicem *Offis Tarsi*, *Offis pollicis* conjunctam, hic pedes trahit nonnihil extrorsum, & dirigit eisdem in motu progressivo, ut rectà porro nitantur sine interno flexu & quasi reditu quodam in seipsos.

Peroneus secundus sive Semifibularis.

Oritur Longus & carnosus à *Fibula* cui adhærescit, & vix dum confecto dimidio stadii sui præbet aspectum tendinis rotundi, transeuntis per *malleolum externum*, & inseritur per duos Tendines in os *Metatarsi*, quod proximè jungitur minimo digitorum.

Flexor Pollicis.

Pollicis
Flexor

Oritur acutus & carnosus à parte *Fibulae* mediæ & posticæ & in descensu dilatatur propè *Malleolum internum*, sub eodem transiens oblique, & inseritur in os *Supremum Pollicis*, qui & magnus pedis digitus à nonnullis dicitur, sub hoc Ligamento reperitur os *Sesamoides*.

Perforans seu Flexor Tertii Internodii digitorum pedis.

Flexor di-
gitorum
pedis.

Oritur carnosus, & longus à posticâ parte *Tibiae*, transiens per eam, & adhaerescens ei secundum longitudinem usque ad medium ejus, ubi in tendinem conversus, fertur ad *Malleolum internum*, ibique in speciem *Cylindricam* compactus fertur sub Ligamento quod ab inferiore appendice *Tibiae* pergit ad os *Calcis*, & tunc dividit seipsum in Tendines quaternos, qui desinunt in Tertiis quibusque articulis quatuor minimorum digitorum pedis.

Perforatus seu Flexor Secundi Internodii digitorum pedis.


Flexor di-
gitorum
pedis.

Ecce tibi alium digitorum pedis flexorem, qui à nonnullis flexor brevis vocatur, & oritur carnosus & membranosus ab extremitate Ossis *Calcis* & transiens ad dimidium Plantæ, dividit seipsum in quatuor tendines rotundos, qui ubi inseruntur, Nempe in secundis articulis quatuor minimorum digitorum, foraminulis pertunduntur ob transmissionem Flexorum Tertii Internodii.

Extensor

Fig. 2.

Fig. 1.





Extensor Tertii Internodii Digitorum Pedis.

O Riginem habet carneam & nervosam ab externo & antico *Tibiæ* auctario, & in progressu carneus, & adhærens ligamento quod *Tibiam Fibulæ* conjungit, descendit rectâ secundum longitudinem *Fibulæ*, & sub ligamento annulari transiens, tribuitur in ligamenta quaterna, quæ in supremam partem *tertii cujusque Internodii quatuor digitorum minimorum* inserta, eisdem suo motu extendere comperiuntur.

*Extensor
Digitorum
pedis.*

Extensor Secundi Internodii Digitorum Pedis.

Oritur latus & carnosus à transverso ligamento in summitate pedis reperto, & tunc ilicò dividit seipsum in Musculos quaternos, qui quando pertigerint ad digitos pedum emittunt ex se singuli singulos tendines ad secundum quodque ossiculum *quatuor minimorum digitorum pedis*, præcipuè vero ad eorundem digitorum articulos sive Internodia secunda, ubi tendines hi interfecant tendines primi *Extensoris*; qui quidem utrique communiter *Extensores* vocantur, Eo quod communem operam navant in extensione *quatuor minimorum Digitorum pedis*.

*Extensor
secundus
Digitorum
pedis.*

Adductor Pollicis, sive magni Digiti pedis.

Oritur nervosus ab internâ parte calcis, & à ligamento quod *calcem Talo* conjungit & inde carne obductus & Cylindricam præ se speciem ferens, mox tendo fit, & inserit se obliquè in lateralem & internam partem *primi articuli pollicis*, & eundem *pollicem* introrsum trahit.

*Pollicis
adductor.*

Transversalis, seu Adductor minor.

Nomen suum debet inventori *Casserio*, quia constringens & comprimens primum articulum à ligamento *minimi in pede digiti* procedentem, fertur transversum facie carnosâ, & pergit cum brevi & lato tendine introrsum ad primum os pollicis; ei hic usus ab Anatomicis assignatur, ut adducat pollicem versus *minimum digitum pedis* eo modo pedem excavans & quasi in arcum cogens itâ ut in locis asperis & confragosis apprehensio

*Adductor
digitorum
pedis.*

quædam fiat à plantâ pedis, similis ei quæ fit à palmis manuum, ut tutius & certiùs ambulemus per prærupta locorum, ope & adminiculo hujus ligamenti vestigia firmiter, & sine lapsus periculo librantes.

Pollicis Tensor.


Tensor pollicis pedis.


Oritur carnosus à *Fibulâ*, vel ut *Vesalio* videtur, ab externâ parte *Tibiæ*, illic ubi à *Fibulâ* separatur, ut & etiam à ligamento quod *Tibiam Fibulæ* conjungit, cui ligamento firmiter adhærens & mox in tendinem conversus transit suprà *Fibulæ* superficiem inferiorem, & sub transverso ligamento inseritur in articulos duos qui in superiore parte pollicis reperiuntur, & eosdem arcu extendit. Nonnunquam hic tendo cernitur in duos dispersitus quorum unus inseritur in ultimum articulum sive Internodium pollicis, alter in os *Metatarsi* quod ei proximè subjectum est.

Lambri.

Fig. 2.

Fig. 1.





Lumbricales seu Flexores Primi Internodii Digitorum.

Oriuntur rotundi & carnosi tendinibus *Perforantis* & *Perforati* & inferuntur per tendines tenuissimos laterali-
 ter *Primis Internodiis digitorum pedis*, & si eos aliquan-
 to pensilatiùs explores, inuenies eos recipere auctarium quod-
 dam fibrarum carnearum à Musculofà quâdam substantiâ in-
 fertâ internæ cavitati *Offis calcis*, quæque pergens esse sui similis,
 hoc est, carnosa per dimidium *Plantæ*, ibi fibris interstingui-
 tur, & ab eâdem nonnunquam tendo exit, pergens inde ad
Primum digitorum Pedis, & constituens *Flexorem Secundi Internodii*,
 quid quod, & tendo *Flexoris Tertii Internodii* per hujus medium
 transit ab eo vix, ac nè vix quidem separabilis?

*Flexores
primi In-
ternodii
Digito-
rum.*

Interossei.

Oriuntur carnosi à lateribus *Ossium Metatarsi*, & externè
 quidem inferuntur per latos quosdam, sed breuiusculos tendi-
 nes in *Primos* quosque *articulos digitorum pedis*, internè autem
Secundis quibusque *Internodiis eorundem*. Quibus abducendis ex-
 terni inserviunt, adducendis Interni, utrique simul in opere
 constituti extensioni eorundem digitorum opem & auxilium
 commune præstant.

*Pedem ab-
liguâ me-
ventis.*

Abductor minimi Digiti.

Abductor hic à calce originationem sortitur extrinsecùs ner-
 uosam, & in progressu carnosus, transit mox cum carneo &
 exili tendine subter os *Metatarsi* (quod antè *minimum digitum*
 proximè collocatur) & inferitur in externam superficiem
Primi Internodii.

*Abductor
minimi di-
giti.*

In plantâ pedis, quæ à Nonnullis vestigium ejusdem dici-
 tur, moles quâdam carnea reperitur, quæ culcitraz, vel pulvina-
 ris instar, tendines defendit cum à frigore & cæli inclementia,
 tum à præruptis & asperis viarum.

Et sic absolvitur integra de Musculis dissertatio, secundum ordinem & usum dissecandi in suas partes distributa, id unice nunc addam, quod sicut initio *Lectori* ob oculos posuimus *Syllabum accuratum*, in quo Musculorum omnium motus particulares unà exhibentur cum eorum reductione in suum quemque locum situmque naturalem, usibus eorum & officiis ubique quam fieri potuit brevissime accuratissimeque descriptis, & nominibus suis, suo cuique Musculo sigillatim insertis, unà cum *Synopsi* quasi digito monstrante, quomodo singuli oriantur in dissectione: sic ad calcem operis adjunctam habes *Tabulam Alphabeticam*, quæ musculo cuique suam propriam Tabulam & figuram assignat, ut eo, si quid dubites, recurras, & reperias ilicò quòd voles.

FINIS TOTIUS OPERIS.



I N D E X

A L P H A B E T I C U S

Omnium Musculorum humani Corporis, qui in hisce nostris Figuris
Æneis enucleantur explicanturque.

A.

A Nisclapto, Tab. 1.
Accelatores Penis, Tab. 6. Tab. 14. f. 1. f. 2.
Ani Sphincter, Tab. 6. Tab. 14. f. 2.
Auriculae Musculi, Tab. 7. Tab. 8.
Auris Elevator, Tab. 7. f. 1. f. 2. Tab. 8. f. 4.
Auris Detraher, Tab. 7. f. 1. f. 3. Tab. 8. f. 4.
Auris Externus Tympani, Tab. 7. Tab. 8.
Auris Internus Tympani, Tab. 7. Tab. 8.
Azygoides, Tab. 10. f. 5.
Acromion, Tab. 20.
Anchoriformis Processus, Tab. 20.
Adductores Interossei, Tab. 24. Tab. 25.
Adductores Interossei, Tab. 24. Tab. 25.
Adductores Interossei Pedis, Tab. 37.
Adductores Interossei Pedis, Tab. 37.
Ani Levatores, Tab. 14. f. 2.
Abductor minimi Digiti, Tab. 22. f. 1. Tab. 24.
 f. 1. f. 2.
Abductor minimi Digiti pedis, Tab. 35. Tab. 37.

B.

Buccinator, Tab. 7. f. 1.
Biventer, Tab. 9. f. 1. 2. Tab. 11. f. 1.
Basioglossus, Tab. 10. f. 2.
Biceps humeri, Tab. 12. Tab. 20.
Brachialis, Tab. 20.
Biceps femoris, Tab. 29. Tab. 32.

C.

Corrugator, Tab. 7. f. 1.
Constrictor nasis, Tab. 7. f. 1.
Crotaphites, Tab. 7. Tab. 11.
Coracohyoidei, Tab. 9. f. 1. f. 2. Tab. 10. f. 1.
Constrictor palpebre utriusque, Tab. 7. f. 1.
Canalis osseus, Tab. 7. f. 4.
Cartilago Scutiformis, Tab. 10. f. 4.
Cryohyoides anticus, Tab. 9. f. 1. f. 3. Tab. 10.
 f. 3. f. 4.
Ceratoglossus, Tab. 9. f. 2. f. 3. Tab. 10. f. 2.
Cartilago Thyroidis, Tab. 10. f. 4.
Cricohyoidei laterales, Tab. 10. f. 4. f. 6.
Cricohyoidei posteriores, Tab. 10. f. 5.
Cucullaris seu Trapezium, Tab. 15.
Cephaloharyngeum, Tab. 10. f. 7.

Complexus, Tab. 16. Tab. 17.
Cremaster, Tab. 14. f. 3.
Chesteris Musculi, Tab. 14. f. 4.
Cars Musculosa quadrata, Tab. 21. f. 1. f. 2.
 Tab. 22. f. 1.
Carpi Extensor exterior, Tab. 23. f. 1. 2. Tab.
 26. f. 2.
Carpi Extensor interior, Tab. 23. f. 1. f. 2. Tab.
 26. f. 2.
Carpi flexor exterior seu Radialis, Tab. 21. f. 1.
 f. 2. Tab. 24. f. 1.
Carpi flexor interior seu Ulnaris, Tab. 21. f. 1.
 f. 2. Tab. 24. f. 1.

D.

Directores Penis, Tab. 6. Tab. 14. f. 1. f. 2.
Dilatator Nasis, Tab. 7. f. 1.
Digastrius, Tab. 9. f. 2. Tab. 11. f. 1.
Deltoideus, Tab. 12.
Detrusor Urine, Tab. 14. f. 1.
Dorsi Longissimus, Tab. 16. Tab. 18.
Dorsi Latissimus, Tab. 15. Tab. 19.
Depressor Labii Superioris, Tab. 7. f. 1.
Depressor Labii Inferioris, Tab. 7. f. 1.

E.

Elevator Palpebre, Tab. 7.
Elevator Labii Superioris, Tab. 7. f. 1.
Elevator Labii Inferioris, Tab. 7. f. 1.
Externus Tympani auris, Tab. 7. f. 4.
Erectores penis, Tab. 6. Tab. 14.
Externus Malleoli, Tab. 7. f. 4. 5. 6.
Extensor Carpi exterior, Tab. 21. f. 1. f. 2.
 Tab. 22. Tab. 23. f. 1. f. 2.
Internus Malleoli, Tab. 7. f. 5. 6.
Epiglottis, Tab. 10. f. 6.
Extensor Carpi interior, Tab. 23. f. 2. Tab. 24.
 f. 2. Tab. 26.
Extensor secundus Digitorum, Tab. 23. f. 1. Tab.
 24. f. 2.
Extensor primus Digitorum, Tab. 23. f. 1. Tab. 24.
 f. 2.
Extensor primus pollicis, Tab. 23. f. 1. f. 2.
Extensor secundus pollicis, Tab. 23. f. 1. f. 2.
Extensor Pollicis, Tab. 34. f. 2. Tab. 36. f. 1.
Extensor secundus Internodii Digitorum, Tab. 23.
 f. 1. Tab. 24. f. 2. Tab. 36. f. 1.
Extensor tertius Internodii Digitorum, Tab. 32.
 f. 2. Tab. 36. f. 1.

INDEX ALPHABETICUS.

F.

- Frontalis*, Tab. 7. f. 1.
Flexor Carpi Interior seu Ulnaris, Tab. 21. f. 1.
 f. 2. Tab. 22. f. 1. Tab. 24. f. 1.
Flexor secundi Internodii sive Perforatus, Tab. 22.
 f. 1.
Flexor tertii Internodii sive Perforans, Tab. 21.
 f. 2. Tab. 22. f. 2.
Flexor Carpi Exterior seu Radialis, Tab. 21. f. 1.
 f. 2. Tab. 24. f. 1.
Flexores pollicis, Tab. 21. f. 2. Tab. 22. f. 1.
Flexor secundi Internodii Pollicis, Tab. 22. f. 2.
Flexor Pollicis primus, Tab. 22. f. 2. Tab. 25. f.
 1. f. 2.
Flexor secundi & tertii Internodii Pollicis, Tab.
 25. f. 2.
Fascialis, Tab. 27.
Flexor Pollicis, Tab. 34. f. 1. f. 2.
Flexor secundus pedis, Tab. 36. f. 2.

G.

- Glandula Inguinales*, Tab. 1.
Genioides, Tab. 9. f. 1. f. 2. 3. Tab. 10. f. 1.
Genioglossus, Tab. 10. f. 1.
Glandula Palatii, Tab. 11. f. 2.
Gemelli, Tab. 10.
Gluteus magnus, Tab. 28.
Gluteus medius, Tab. 28.
Gracilis, Tab. 30.
Gluteus minimus, Tab. 32.
Gastrocnemius externus, Tab. 33. f. 1. f. 2.
Gastrocnemius internus, Tab. 33. f. 1. f. 2. Tab.
 35. f. 1.

H.

- Hyothyroides*, Tab. 9. f. 1. f. 2. Tab. 10. f. 3.
Hypoglossus, Tab. 9. f. 2.
Os Hyoides, Tab. 9. f. 2.

I.

- Incus*, Tab. 7. f. 4. Tab. 8. f. 7.
Internus Tympani Auris, Tab. 7. Tab. 8.
Internus Malleoli, Tab. 7. Tab. 8.
Interosseales, Tab. 3. Tab. 13. Tab. 18.
Interossei, Tab. 25. f. 1. 2.
Indicis abductor, Tab. 23. f. 1.
Interossei adductores, Tab. 24. f. 1.

- Interossei adductores*, Tab. 24. f. 1.
Iliacus internus, Tab. 29.
Indicis abductor, Tab. 35. f. 2.
Duo ex Interossei, Tab. 36. f. 2. Tab. 37. f. 1.
 5. *Interossei abductores*, Tab. 37. f. 1. f. 2.
 5. *Interossei adductores*, Tab. 37. f. 1. f. 2.
Internus Depressor, seu Pterygopalatinus Tab. 11.
 f. 2.

L.

- Linea alba*, Tab. 1. 2.
Linea Semilunaris, Tab. 2.
Labii Superioris Elevator, Tab. 7. f. 1.
Labii Inferioris Elevator, Tab. 7. f. 1.
Labiorum Sphincter, Tab. 7. f. 1.
Longus, Tab. 11. f. 3.
Latissimus Dorsi, Tab. 15. Tab. 19.
Levator Palatinae, Tab. 11. f. 3. Tab. 15. Tab.
 19.
Longissimus Dorsi, Tab. 16. Tab. 18.
Levatores Ani, Tab. 14. f. 2.
Lumbricales, Tab. 22. f. 2. Tab. 25. f. 1.
Ligamentum annulare, Tab. 22. f. 1. Tab. 24.
 f. 2.
Lividus, Tab. 27. Tab. 30.
Lumbricales, Tab. 36. f. 1. Tab. 37. f. 1.

M.

- Masseter*, Tab. 7. f. 1. Tab. 11. f. 1.
Malleolar, Tab. 7. f. 5. 6. Tab. 8. f. 1.
Myloglossus, Tab. 9. f. 3. Tab. 10. f. 2.
Massideus, Tab. 11. f. 3.
Minimi digiti abductor, Tab. 25. f. 1. f. 2.
Membrana nervosa, Tab. 7. f. 3.
Marsupialis, Tab. 18. Tab. 32.
Marsupium, Tab. 32.
Membranosus, Tab. 30.
Minimi digiti abductor, Tab. 22. f. 1. Tab. 24.
 f. 1. f. 2.
Minimi digiti adductor, Tab. 35. f. 2. Tab. 37.
 f. 1. f. 2.

N.

- Nasi Dilator*, Tab. 7. f. 1.
Nasi constructor, Tab. 7. f. 1.
Nervus opticus, Tab. 8. f. 5.
Nervus motorius, Tab. 8. f. 2.
Notus humeri Placentini, Tab. 20. f. 1. 2.

INDEX ALPHABETICUS.

O.

Obliquus descendens, Tab. 1. 2.
 Obliquus ascendens, Tab. 2. 3. 4.
 Orbicularis Claustror, Tab. 7. f. 1.
 Obliquus externus oculi, Tab. 8. f. 3. 5.
 Obliquus internus oculi, Tab. 8. f. 3. 5.
 Oculi Elevator, Tab. 8. f. 3.
 Oculi abductor, Tab. 8. f. 3.
 Oculi depressor, Tab. 8. f. 3.
 Os squamosum, Tab. 7. f. 2. 3.
 Os Petrosum, Tab. 8. f. 1.
 Oesophagus, Tab. 10. f. 7.
 Obliqui Superiores, Tab. 17. f. 1. 2.
 Obliqui Inferiores, Tab. 17. f. 1. 2.
 Osseus humeri Placentini, Tab. 19.
 Os occipitalis, Tab. 8. f. 1.
 Os humeri, Tab. 19.
 Os Hyoides, Tab. 9. f. 2.
 Osso Pubis, Tab. 27. 32.
 Obturator externus, Tab. 29. 30. 31. 32.
 Obturator internus, Tab. 32.

P.

Processus Stylodes, Tab. 7. f. 2. 4. Tab. 8. f. 1.
 Tab. 9. f. 2.
 Processus Mastoideus, Tab. 7. f. 3. 4.
 Processus Zygomaticus, Tab. 7. f. 2.
 Pectoralis, Tab. 1. 12.
 Pyramidales, Tab. 3. 4. 5.
 Peritoneum, Tab. 5.
 Penis quatuordecim, Tab. 6. 14. f. 1. 2.
 Penis Dorsales, Tab. 6. 14. f. 1. 2.
 Palspelve Elevator, Tab. 7. f. 1.
 Pterygoidei interni, Tab. 11. f. 1. 2.
 Pterygoidei laterales, Tab. 11. f. 2.
 Pterygoidei externi, Tab. 11. f. 1.
 Palmaris, Tab. 21. f. 1. 2. Tab. 22.
 Pollicis flexores, Tab. 21. f. 1. 2. Tab. 23. f. 1.
 Pronator Radii Teres, Tab. 21. f. 1. 2. Tab. 22.
 f. 1. 2.
 Perforans, Tab. 21. f. 1. 2. Tab. 23. f. 1.
 Perforans, Tab. 21. f. 1.
 Palmaris extra firmum, Tab. 22. f. 1.
 Pronator Quadratus, Tab. 21. f. 2. Tab. 24. f. 1.
 Pollicis adductor, Tab. 23. f. 2.
 Pollicis abductor, Tab. 22. f. 2. Tab. 23. f. 2.
 Tab. 25. f. 1. 2.
 Pollicis flexor primus, Tab. 22. f. 2. Tab. 25.
 f. 1. 2.
 Primus secundi Internodii pollicis, Tab. 22. f. 2.

Secundus Pollicis flexor, Tab. 25. f. 2.
 Secundus & tertius secundi Internodii flexor, Tab.
 25. f. 2.
 Psoas, Tab. 27.
 Pyriformis, Tab. 28. 29.
 Plantaris, Tab. 33. f. 2. Tab. 35. f. 1.
 Pollicis Tensor, Tab. 34. f. 2.
 Peroneus secundus, Tab. 34. f. 1. 2. Tab. 36. f. 1.
 Pollicis abductor, Tab. 34. f. 1.
 Perforatus, Tab. 35. f. 1. 2. Tab. 37. f. 11.
 Perforans, Tab. 37. f. 2.
 Pollicis flexor, Tab. 35. f. 1. 2.
 Peroneus primus, Tab. 36. f. 1. 2.
 Pollicis adductor, Tab. 36. f. 1. Tab. 37. f. 1. 2.
 Plantaris Tendo, Tab. 38. f. 2. Tab. 37. f. 1.

Q.

Quadratus, Tab. 11. f. 1.
 Quadratus, Tab. 18. 29.
 Quadrigeminus, Tab. 32.

R.

Rectus abdominis, Tab. 2. 3. 4.
 Rectorum intersecciones, Tab. 3.
 Recti extra firmum, Tab. 5.
 Pars Recti Intestini, Tab. 14. f. 1. 2.
 Rhomboides, Tab. 15. 16. 19.
 Recti majores, Tab. 17. f. 1. 2.
 Recti minores, Tab. 17. f. 1. 2.
 Rotundus, Tab. 19.
 Radii supinator longus, Tab. 16. f. 1. 2.
 Radii supinator brevis, Tab. 23. f. 1. 2.
 Rectus Femoris, Tab. 27. 30. 31.

S.

Stapes & ejus musculus, Tab. 7. f. 7. 8.
 Sternus, Tab. 13.
 Serratus major anticus, Tab. 1. 12. 13.
 Sphincter Ani, Tab. 6.
 Sphincter vesicae, Tab. 14. f. 1.
 Serratus minor anticus, Tab. 13.
 Sphincter Labiorum, Tab. 7. f. 1.
 Superciliorum musculus, Tab. 7. f. 1.
 Stylocranialis, Tab. 9. f. 1. 2. Tab. 10.
 f. 1.
 Styloglossus, Tab. 9. f. 2. Tab. 10. f. 2.
 Sternohyoides, Tab. 9. f. 1. 2. Tab. 10. f. 1.
 Sternohyoides, Tab. 9. f. 1. 2. Tab. 10. f. 3.
 Stylohyaryngeus, Tab. 10. f. 7.

Sphero-

INDEX ALPHABETICUS.

- Sphaespharygeus*, Tab. 10. f. 7.
Sphaespharygeus, Tab. 11. f. 2.
Scalenus, Tab. 11. f. 3.
Subclavius, Tab. 13.
Scapula dextra, Tab. 20.
Subscapularis, Tab. 13. Tab. 15.
Suprascapularis superior, Tab. 15. Tab. 19.
Spina vertebrarum, Tab. 19.
Suprascapularis inferior, Tab. 15. Tab. 19.
Serratus posterior superior, Tab. 16.
Serratus posterior inferior, Tab. 16.
Sacrolumbus, Tab. 16.
Splenius, Tab. 17. f. 1. Tab. 18.
Semispinatus, Tab. 17. f. 1. Tab. 18.
Spinatus, Tab. 17. f. 2.
Sacer, Tab. 18.
Spina ossis Ileum, Tab. 17. Tab. 28.
Sartorius, Tab. 30.
Supinator Radius longus, Tab. 26. f. 1. f. 2.
Supinator Radius brevis, Tab. 23. f. 1. f. 2. Tab. 2.
 Tab. 26. f. 1. f. 2.
Semivervosus, Tab. 32.
Semimembranosus, Tab. 32.
Subpopliteus, Tab. 33. f. 2. Tab. 35. f. 1.
Trochlearis Musculus, Tab. 8. f. 5.
Trochlea ipsa, Tab. 8. f. 5.
Tympanum, Tab. 7. f. 4. Tab. 8. f. 1.
Tympani externus Musculus, Tab. 7. Tab. 8. f. 4.
 f. 5. f. 6. Tab. 8. f. 6.
Tympani internus Musculus, Tab. 7. Tab. 8. fig. 5.
 f. 6. f. 9. Tab. 8. f. 6.
Thyroarytenoideus, Tab. 10. f. 4. f. 6.
Transversalis Colli, Tab. 17. f. 1. Tab. 18.
Trigeminus, Tab. 18.
Triceps, Tab. 29. Tab. 30. Tab. 31.
Transversalis, Tab. 34. f. 1. Tab. 36. f. 2. Tab.
 37. f. 3.
Tibialis anterior, Tab. 34. f. 2. Tab. 36. f. 1.
Tibialis posterior, Tab. 34. f. 1. Tab. 35. f. 1. f. 2.
 Tab. 36. f. 2.
 V.
Vaulta, Tab. 11. f. 2.
Vastus externus, Tab. 31.
Vastus internus, Tab. 30. Tab. 31.
Vesica sphincter, Tab. 14. f. 1.
Vesica cervix, Tab. 14. f. 1.

T.

- Transversalis abdominis*, Tab. 5.
Temporalis, Tab. 7. f. 1. Tab. 11. f. 1.

Z.

- Zygomaticus Riolani*, Tab. 7. f. 1.

BIBLIOPEGIS.

Hunc Librum qui compingendum suscipiet rogatur, ut numero seu folio suo singulas Tab: vel figuras adaptet ac reponat. Tres autem supernumerarias earundem figur: a Capite vel ab initio libri una, collocabit.

FINIS INDICIS.